اً وجد ناتج ما يأتي باستخدام العامل المشترك الأعلى : $(10)^{1} - 10 \times 10^{-1}$

(ب) أوجد خارج قسمة:

[0] (أ) في الشكل المقابل:


س ص من على س ص على س ص على من ص خ صفر

$$\frac{\circ}{\gamma} = \omega \quad , \quad \frac{\gamma}{3} = \omega = \frac{\gamma}{\gamma} \quad , \quad \omega = \frac{\gamma}{\gamma}$$

فأوجد في أبسط صورة قيمة المقدار : - ص - ص

(ب) استخدم خواص جمع الأعداد النسبية في إيجاد قيمة المقدار:

$$\frac{\gamma \lambda}{\circ} + \left(\frac{\gamma \circ -}{\xi}\right) + \left(\frac{\gamma \gamma}{\circ} -\right) + \frac{\circ}{\xi}$$



صهر متوازیا المستطیلات العمل متوازی مستطیلات آخر

ارتفاعه (٢ + ب) أوجد مساحة قاعدة متوازى المستطيلات الجديد.

(ب) يوضح الجدول التالى أعداد تلاميذ الصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادي

بإحدى المدارس بالمصورات:

أعداد التلاميذ	الصف		
77.	الأول		الصف الأول
۲.	الثاني	٠.	الصف الثاني
١٨٠	الثالث		الصف الثالث

مثل أعداد الصفين الثاني والثالث الإعدادي بالمصورات.

امتحانات بعض مدارس المحافظات



إدارة المعادى توجيه الرياضيات

محافظة القاهرة

أجب عن الأسئلة الأتية :

- اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
- (۱) الشرط اللازم ليكون العدد $\frac{V}{V}$ عددًا نسبيًا هو $V \neq V$
- i) ۷ (ج) ۲ (ج) ۷ (۱) صفر
 - $\dots \times \mathcal{L} = {}^{\mathsf{T}} \mathcal{L} \wedge \mathsf{L} \wedge \mathsf{L} = \mathsf{L} \wedge \mathsf{L} \wedge$
- ٢٠٠٢ (ع) ٢٠٠٥ (ج) ٢٠٠٥ (ع) ٢٠٠١ (١)
 - (٣) الوسط الحسابي للقيم: ٤ ، ٦ ، ٣ ، ٢ ، ٥ هو
 - ٠ (١) ٦ (ب) ٢ (ج) ٣
- (٤) العدد النسبى الذي يقع في منتصف المسافة بين العددين $\frac{0}{V}$ ، $\frac{9}{V}$ هو
 - (i) $\frac{1}{\sqrt{y}}$ (i) (i)
 - (ه) الحد الجيرى: ٦ -س ص من الدرجة
 - (١) السادسة. (ب) الثانية. (ج) الثالثة. (د) الخامسة.

ا أكمل ما يأتي:

- المعكوس الضربي للعدد $\left|\frac{-7}{7}\right|$ هو
- (۱) إذا كان: $-\infty + \frac{0}{-0} = V + \frac{0}{V} = 0$ فإن: $-\infty = 0$
 - (٣) المنوال للقيم : ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٥ ، ٣ ، ٤ ، ٣ ، ٥ هو
 - $10 + \dots + 7 = (\dots + 7)(1)$
 - (ه) باقی طرخ ۲ من ٤ هو

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- (١) الحد الجبرى: ٥ -س ص من الدرجة
- (١) الثانية. (ب) السابعة. (ج) الخامسة. (د) العاشرة.
 - (۲) الشرط اللازم لجعل $\frac{-u}{1-v}$ عددًا نسبيًا هو
- $\nabla \neq 0 \rightarrow (1)$ $\frac{0}{2} \neq 0 \rightarrow (2)$ $0 \rightarrow 0 \rightarrow (1)$ $0 \rightarrow 0 \rightarrow (1)$
 - (٣) الوسط الحسابي للقيم: ٧ ، ٣ ، ١ ، ٥ ، ٤ هو
 - ٥(١) ٢(١) ٢(١)
 - (٤) المنوال للقيم : ٤ ، ٥ ، ٣ ، ٧ ، ٤ ، ٨ هو
 - $\Lambda(\Box)$ $V(\Rightarrow)$ $\xi(\psi)$ $\Upsilon(\dagger)$
- هوهالعامل المشترك الأعلى للمقدار الجبرى : Υ V ص + V V V ص هوهامل المشترك الأعلى للمقدار الجبرى : Υ Υ -
 - $\frac{\gamma}{\delta}$ ، رأ) أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين : رأ
 - $\frac{r}{V} 1$ استخدم خاصیة التوزیع فی إیجاد ناتج : $\frac{r}{V} + 1$ \times $\frac{r}{V} + 1$
 - (۱) اطرح: ٥ س ۲ + ص س ص من ۲ س ۲ + ۲ س ص + ٥ ص ۲
 - (ب) اقسم: س٬ ۸ س + ۱۲ علی س ٦ حیث س ≠ ٦
- Y = 1 ثم أوجد القيمة العددية للناتج عندما Y = (T + T)(T + T)
- العدد الأى يقع في ربع المسافة بين العددين : $\frac{7}{3}$ ، $\frac{-0}{\sqrt{3}}$ من جهة العدد الأكبر.
 - (ب) الجدول التالي يبين توزيع درجات ٣٠ تلميذًا في أحد الاختبارات:

المجموع	٩	٨	٧	٥	۲.	الدرجة
٣.	٦	0	٩	٦	٤	عدد التلاميد

- (١)مثل البيانات بالأعمدة البيانية.
 - (٢)أوجد الدرجة المنوالية.



- استخدم خاصیة التوزیع لإیجاد ناتج : $\frac{7}{V} \times 0 + \frac{7}{V} \times 7 \frac{7}{V} \times 3$
 - (ب) إذا كانت : $1 = \frac{1}{3}$ ، $= \frac{1}{3}$ أوجد قيمة : (1 + -) ÷ (1 -)
 - ٣- س + ص + ٥ ، ٢ س + ص + ٥ ، ٢ س + ص − ٣
 - (-) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى : ۱۲ 7 $^{-1}$ 7 $^{-7}$
 - ا أ) أوجد خارج قسمة:

(ب) الجدول التالي يبين درجات طلاب أحد الفصول في مادة الرياضيات:

١.	٩	٨	٧	٦	٥	الترجة
۲	٣	٦	٨	١.	٤ .	عدد التلاميد

إدارة الزيتون

توجيه الرياضيات

- (١) مثل البيانات بالأعمدة البيانية.
 - (٢) أوجد الدرجة المنوالية.



محافظة القاهرة

أجب عن الأسئلة الأتية :

أكمل ما يأتي :

- (۱) العدد الذي ليس له معكوس ضربي هو
 - 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- (٣) إذا كان ترتيب الوسيط لعدد من القيم هو الرابع فإن عدد هذه القيم =
 - $10 \dots + \Upsilon \longrightarrow \Upsilon = (0 + \omega) (\Upsilon \omega \Upsilon) (\xi)$
 - (ه) إذا كان: $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}$ فإن: $-\omega = \cdots$





ادارة المطربة توحيه الرياضيات

محافظة القاهرة

أجب عن الأسئلة الأتية :

أكمل ما يأتي :

- (١) العدد النسبي الذي ليس له معكوس ضربي هو
- (۲) الشرط اللازم ليكون $\frac{1}{1+\pi}$ عددًا نسبيًا هو $\tau \neq \cdots$
- (٣) الوسط الحسابي للقيم : ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٥ ، ٨ هو
- (٥) الحد الجبري: ٣ ٢٠ من الدرجة ومعامله يساوي

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

$$1 \cdot - \cdots + ^{\mathsf{T}} = (0 + \omega_{\mathsf{T}}) (\mathsf{T} - \omega_{\mathsf{T}}) (\mathsf{T})$$

الخاصية المستخدمة في إجراء العملية
$$\frac{7}{3} \times 1 = \frac{7}{3}$$
 هي خاصية

- الإبدال. الإبدال. المايد الضربي. (د)المحايد الجمعي.
 - 🤫 العدد ۴٫۰ على صورة 🖰 هو
 - $\frac{1}{r}$ $\frac{1}{\epsilon}$
 - ۲۰۰۰ تزید عن ۸ ۲ بمقدار۲
 - 10---8 YE(a)
 - الوسيط للقيم : ٤ ، ٨ ، ٦ ، ٧ ، ٣ هو
 - 1.
 - أوجد ناتج جمع : ٣ س + ه ص ١ ، -ه ص + ٢ س + ٣
 - إ _ اختصر لأبسط صورة : (-س ه) (-س + ه) + ه ٢ _
 - ثم أوجد القيمة العددية للناتج عندما 🕳 🛣



 $\frac{\circ}{V} - 1. \times \frac{\circ}{V} + \circ \times \frac{\circ}{V}$ استخدام خاصية التوزيع أوجد قيمة : $\frac{\circ}{V} - 1. \times \frac{\circ}{V} + \circ \times \frac{\circ}{V}$

- (-) أوجد خارج قسمة : $-0^7 + 7 0 + 7$ على -0 + 7 (حيث $-0 \neq -7$)
 - $\frac{r}{0}$ ، $\frac{1}{r}$: أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين
 - (ب) الجدول التالي يبين درجات ٣٠ تلميذًا في أحد الاختبارات:

١٧	١٥	١٢	٩	٦	الدرجة
7	. 0	٨	٧	٤	عدد التلاميذ

مدارس المستقبل الخاصة

مثل هذه البيانات بالأعمدة البيانية ثم أوجد الدرجة المنوالية.

محافظة الحبزة

أجب عن الأسئلة الأتية :

أكمل ما بأتى :

- (۱) العدد $\frac{9}{2}$ يكون نسبيًا عندما $\rightarrow 0 \pm \dots$
- (١) إذا كان الوسط الحسابي للقيم: ٤ ، ٥ ، ١ ، ص هو ٣ فإن: ص =

 - $q + \dots = {}^{r}(r \underline{\mathcal{C}})$
 - (ه) الحد الجبرى: ه س^٢ ص من الدرجة ومعامله

🥻 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- (١) المنوال للقيم : ٨ ، ٧ ، ١ ، ٧ ، ٣ هو
- (پ) ۳ ۸ (i). (ج) ۷ 1(2)
 - (۲) المعكوس الجمعى للعدد $\left(\frac{1}{w}\right)'$ هو
- $7V (\Rightarrow) \qquad \frac{7V}{1-}(\Rightarrow) \qquad \frac{7V}{1}(\uparrow)$ 9-(1)
 - (٣) ا س + ۳ ÷ ۳ س = سسسس حيث س ≠ صفر
- (۱) ۱۸ س (ب) ۲ س (د) - ٢-س



- $\frac{3}{p}$ باقی طرح $\frac{3}{p}$ من $\frac{-6}{p}$ =
- $1 (\Rightarrow)$ $\frac{1}{q} (\psi)$ $\frac{1-}{q} (1)$
 -= | T- | × | T | (o)
- ١- (١) ١- (١) ٦- (١)
 - (1) اجمع: ٢-٠٠٠ ٦-٠٠ ، ٢-٠٠ ٢-٠٠٠ + ٧
- (ب) اقسم: $(-0^7 + 6 0^7 + 1)$ على $(-0^7 + 7 0 + 1)$ على القسوم عليه لايساوى الصفر
- - $\frac{1}{\gamma}$ إذا كان: $-\omega = \frac{\gamma}{\gamma}$ ، $\omega = \frac{1}{3}$ ، $\omega = \frac{1}{\gamma}$) وجد القيمة العددية للمقدار: $(-\omega \times \omega) 3$
 - (ج) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ١٢ س ° ص ٣٠ ٣٠ س
 - $\frac{1}{6}$ ، $\frac{1}{6}$: أوجد العدد النسبى الذي يقع في ثلث المسافة بين $\frac{1}{6}$ ،
 - (ب) الجدول التالي يبين عدد الغائبين في إحدى المدارس خلال أسبوع:

	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الأثنين	الأحد	اليوم
-	۱۳	٩	>	11	٨	عدد الغائبين

ارسم بيانيًا الجدول السابق بطريقة الخط المنكسر.



1-(1)

إدارة الوراق مدرسة الوفاء - مسائى

regarded to the experience of the control of the co

محافظة الحيزة

أجب عن الأسئلة الآتية :

- أكمل ما يأتى : (١) درجة الحد الجبرى : ٤ -س^٣ ص هي
- (٢) الوسط الحسابي للقيم : ٦ ، ٨ ، ٥ ، ٩ ، ٢ هو
 - (٣) المعكوس الجمعى للعدد $\left(-\frac{1}{\pi}\right)^{\cot i}$ هو

- العامل المشترك الأكبر للمقدار : ٩ Y ص Y Y مو
 - (٥) المنوال القيم: ٣، ٤، ٥، ٣، ٦ هو
 - اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
 - ن الذا کان: $\frac{7}{6}$ س = ۱ فإن: س =
- (٢) إذا كان الحد الجبرى: ٤ س ص من الدرجة الخامسة فإن: م =
 - (ن) ۲ (خ) ۲ (۱) ۱(۱)
 - (٣) الوسيط للأعداد : ٢ ، ٧ ، ٣ ، ٥ ، ٦ هو
 - ۱) ۲ (ب) ۲ (ج) ۲ (۱) ۲ (1) ۲ (
 - (غ) (س ۲ + س) ÷ س = سدسس حيث س م صفر
 - ١(١) ٢٠٠٠ (ب) ١٠٠٠ (١)
 - (ه) (س ۳) = س ۲ ۲ س +
 - $\Upsilon(\mathfrak{z})$ $\Upsilon(\mathfrak{z})$ $\mathfrak{P}(\mathfrak{z})$
- (ب) أوجد خارج قسمة : ۱۸ س 3 7 س 7 + 7 س 7 ÷ 7 س رحيث س 7 صفر)
 - ع (أ) اطرح : ٤ س ^٢ ٩ س ٥ من ٢ س ٢ ٤ س ٥
 - $\frac{\gamma}{r}$ ، $\frac{r}{0}$: أوجد عددًا نسبيًا يقع في منتصف المسافة بين العددين $\frac{\gamma}{r}$
 - استخدم خاصیة توزیع الضرب علی الجمع والطرح فی إیجاد ناتج : $\frac{\xi}{4} \times 10 \times \frac{\xi}{4} + 10 \times \frac{\xi}{4}$
 - (ب)الجدول الآتي يوضح درجات ٣٠ طالبًا في مادة الرياضيات:

١.	٩	٨	٧	٦	٥	الدرجة
 ۲	٤	٩	٧	0	٣	عدد التلاميد

مثل البيانات السابقة بالأعمدة البيانية.





(د.) ٤

ادارة المنتزه توجيه الرياضيات - الفترة الصباحية

محافظة الإسكندرية

أجِب عن الأسئلة الأتية :

ا أكمل ما يأتي :

- (۱) الحد الجبرى: ٣ -ن ص ٢ من الدرجة ومعامله يساوى
 - (٢) المنوال لمجموعة القيم: ٣،٧،٨،٧،٣ هو
 - - $1 = \dots \times \frac{r_{-}}{V} (\xi)$
 - (ه) v, v في صورة أ هو

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- (١) الوسط الحسابي للقيم : ٥ ، ٧ ، ٣ هو
- (ب) ه r(1)
 - رع) المعكوس الضربى للعدد $\left(rac{1}{7}
 ight)^{
 m out}$ هو
- 1-(2) (خ) ا (ب) ۲
 - $\cdots\cdots = {}^{\mathsf{Y}}\mathsf{P} \; \mathsf{T} \times \mathsf{P} \circ (\mathsf{T})$
- (6)017 * A (1)
 - (3) إذا كان: $\frac{7}{9-9}$ عددًا نسبيًا فإن: $9 \neq \cdots$
- (د)صفر (خ) ۲ ٥- (ب) °(i)
 - (ه) الوسيط للقيم: ٥ ، ٧ ، ٤ هو
- 17(7) ٧ (ج) (پ) ٤
- $V imes rac{\circ}{1\lambda} + 1$ ا باستخدام خاصية التوزيع أوجد ناتج: $rac{\circ}{1\lambda} imes 11 + rac{\circ}{1\lambda} imes V$
 - $\frac{1}{r}$ ، $\frac{1}{r}$ ؛ أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين

٣-٠٠٠ ، -٠٠٠ + ٣-٠٠ ، من -٥-٠٠) الجمع: ٤ -٠٠٠ + ٣-٠٠٠ ، من -١٠٠٠ الجمع : ٤ -٠٠٠ ، من -١٠٠٠ المالية

$$(-)$$
 أوجد خارج قسمة : $-0^7 + 7 - 0 + 7$ على $-0 + 1$ (حيث $-0 \neq -1$)

(1) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ٣ - ١ - ٩ - س

(ب) الجدول الآتي يوضح درجات ٢٥ تلميدًا في اختبار الرياضيات:

4	Α,	٧	. 7	o	الدرجة
۲	٦	٩	٥	٣	التكرار

(١) مثل البيانات السابقة بالأعمدة السانية.

(٢) أوجد الدرجة المنوالية.

(د)≥

ادارة غرب شيرا الخيمة توجيه الرياضيات - مسائى

محافظة القليوبية

أجب عن الأسئلة الاتية :

أكمل ما يأتي :

- / $= \frac{\sqrt{0}}{\sqrt{0}}$
- $12 \dots$ (Y U Y) = (Y U Y)
- (٣) العدد الذي معكوسه الضربي هو نفسه هو
- (٤) إذا كان الوسط الحسابي القيم: ك ، ٥ ، ٤ ، ٩ ، ٤ هو ٥
 - فإن : قيمة ك =
 - $1 = \cdots \times \Upsilon \frac{1}{5}$ (a)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- $\frac{r}{r}$ $\frac{\xi}{V}(1)$
- (ب) < <(i) (ج)=
 - (٢) الحد الجبرى: ٣ س ص من الدرجة
- (١) الأولى. (ب) الثانية. (ج) الثالثة. (د) الرابعة.

- (3) إذا كان: Y v 7 ص = صفر فإن: $\frac{v}{2}$
 - (a) إذا كان: (٢ -س ٣) (٣ -س + ٥) = ٢ -س ٢ + ك ١٥ فإن : ك =

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- عدد الأعداد الصحيحة الواقعة بين $\frac{V}{V}$ ، $\frac{V}{V} = \dots$
- (ب) ١ (د) عدد لا نهائي
- - (ب) ۲ (ج) ۳
- (٤) إذا كان المنوال للقيم: ٣ ، ٥ ، ١ + ١ ، ٥ ، ٣ هو ه فإن: ١ =
- (۱) ٤ (١) ٢ (ج) ٢ (ج)
 - (٥) إذا كان الوسط الحسابي لدرجات عشرة طلاب هو ٥
 - فإن مجموع درجاتهم هو
 - (ب) ۳۰ (ج) ٤٠ ۲۰ (۱) 0. (7)

[] باستخدام خواص ضرب وجمع الأعداد النسبية أوجد قيمة:

$$\frac{71}{77} - \frac{71}{77} \times \frac{10}{11} + \frac{71}{77} \times \frac{0}{11}$$

(ب) الجدول التالي يوضح عدد ساعات المذاكرة اليومية لأحد التلاميذ خلال أسبوع:

الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الأثنين	الأحد	السبت	أيام الأسبوع
٥	٦	٨	. 9	٦	. V	٨	عدد الساعات

- (١) مثل هذه البيانات بالخط البياني المنكسر.
- (٢) أوجد الوسط الحسابي لعدد ساعات المذاكرة.




- (ب) ۳ (ج) ٤ $\cdots = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)$
- (د)غير ذلك (ج) ٣ ۲ (پ)
- (٥) المتوال للقيم: ١ ، ٣ ، ٧ ، ٣ ، ٧ ، ٣ هو
- (ب) ۲ (۱) (ج) ۲ (۱)
- (1) مستطيل مساحته: ٨٩٤ ب٢ + ١٢ ٢٩ ع ٨٩٢ ك وحدة مساحة. وطوله ٤ 7' \sim وحدة طول. أوجد العرض إذا كان 1 = 1 ، ~ 7
- $\frac{\circ}{1}$ استخدم خاصية التوزيع لإيجاد قيمة : $\frac{\circ}{1}$ × $\frac{\circ}{1}$ + $\frac{\circ}{1}$ × $\frac{\circ}{1}$ + $\frac{\circ}{1}$
- ع (1) اجمع: ه س+ ۲ ص − ۱ ، ۲ س − ه ص + ۲
- (ب) أوجد خارج قسمة : س ۲ + ۱ على س + ۱ (حيث س ل + ۱)
 - $\frac{1}{Y} = \checkmark \qquad \checkmark \qquad \frac{V}{2} = 1$

(ب) في الشكل المقابل:

مساحة الجزء المظلل

أوجد المقدار الجبرى الذي يعبر عن





محافظة الشرقية

توجيه الرياضيات - الفترة الصباحية

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسهج باستخدام الآلة الحاسبة)

أكمل ما يأتى:

- (١) الواحد عدد محايد بالنسبة لعمليةفي الأعداد النسبية.
- (٢) الحد الجبرى: ٣ كُن ص من الدرجة ومعامله يساوى
 - (٣) الوسيط لمجموعة القيم: ٤٤ ، ٢٠ ، ١٠ ، ٣٢ ، ٩ هو

- Y = -V = 2 V = 3 -
- (ب) إذا كان: $-\omega = \frac{\sqrt{\sqrt{2}}}{2}$ ، $\omega = \frac{\sqrt{2}}{2}$ أوجد قيمة المقدار: $(-\omega \omega) \div (-\omega + \omega)$
 - ر أ) أوجد عددًا نسبيًا يقع في ثلث المسافة بين : $\frac{3}{\sqrt{2}}$ ، من جهة الأصغر.
 - (ب) أوجد خارج قسمة : ٣ س · + س · س ٣ على سن · ١ ١ علمًا بأن المقسوم عليه للا الصفر.



توجيه الرياضيات - قطاع (٢)

محافظة المنوفية

أجب عن الأسئلة الأتية :

أكمل ما يأتي :

- (٢) المنوال لمجموعة القيم: ٣ ، ٤ ، ٣ ، ٤ ، ٤ هو
- (٣) الوسيط لمجموعة القيم: ٧ ، ٨ ، ٤ ، ٩ ، ٢ هو
 - $1 = \dots \times \Upsilon \stackrel{1}{=} (\xi)$
- (ه) إذا كان : ٢ + ـ = ٧ ، هـ و = ٣ فإن : ٢ (هـ و) + ـ (هـ و) = ···········

🚮 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- (١) أكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام : ٧ ، ٦ ، ٩ ، ١ هو
- (ب) ۱۹۷۷ (ج) ۱۲۷۹ . (د) ۲۷۶۱
 - (٢) إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة القيم : ٢ ، ٤ ، س ، ٥ هو ٤
 - فإن : س =
 - (ټ) ۳ (۱)٤ (د) ۲ (ج) ہ
- (٣) متوازى مستطيلات أبعاده ٢ سيم ، ٣ سيم ، ٤ سيم فإن حجمه =سيم٢
 - (پ) ۲۶ 11(1) (خ) ۲۶ (د) ۸۶

- (٤) العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين : $\frac{1}{5}$ ، $\frac{1}{5}$ ، هو $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)$

 - $.... = |\frac{1}{5}| + /. (0)$
- $\frac{1}{Y_{\bullet}} \stackrel{\bullet}{(-)} \qquad \frac{4}{Y_{\bullet}} \stackrel{\bullet}{(-)} \qquad \frac{V}{Y_{\bullet}} \stackrel{\bullet}{(1)}$ 17 (2)
- (-) 1 d(- : - ?
 - (1) اختصر (1) (س + ۲) (2+4) (س + ۲) (س ۲)
 - $\frac{\delta}{\Lambda}$ ، $\frac{1}{\Lambda}$: (ب) أدخل عددين نسبيين بين
 - $\frac{r}{V} r \times \frac{r}{V} + o \times \frac{r}{V} + o \times \frac{r}{V}$ استخدم خاصية التوزيع في إيجاد قيمة :
 - (ب) الجدول التالي يوضح درجات ٣٠ طالبًا في امتحان مادة الرياضيات:

(.\V	10	١٢	9	٦.	الدرجة
	7	0	· .	٧	٤	عدد الطلاب

- (١) مثل البيانات بخط منكسر.
- (١) أوجد الدرجة المنوالية.

(د) ۱۱۰۸ . .

⊅(3)

إدارة غزب المحلة الكبرى م. الشهيد عبدالمنعم رياض - الفترة الصباحية

محافظة الغربية

أجب عن الأسئلة الأتية :

- اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
 - $\cdots = \frac{11}{4}(1)$
- (پ) ۱۸ (·, \\(1) (ج) ۱۸, ۰
 - (۱)-۱۷|-(۱)
- (ب) ∉ ∋(i) $\supset (\rightleftharpoons)$
- (٣) الوسيط للقيم : ٣ ، ١٠ ، ١٥ ، ٨ ، ٦ هو
- (ب) ۱۰ (ب) .17(1)
- الحام (رياضيات مراجعة) م ٢ / أولى إعدادي / التيرم الأول (١٣٣٠

(٤) المعكوس الجمعي للعدد ٢٥٪ هو

$$(0)$$
 إذا كان : $(-0 - 0)$ $(-0 + 0) = -0^{7} + 1$ فإن : $1 = 0$

🚹 أكمل ما يأتي :

- (١) درجة الحد الجبرى: ٩ ٠٠ ص هي
- (٢) الوسط الحسابي للقيم: ٢ ، ٥ ، ١١ ، ٤ ، ٨ هو

$$= \frac{7 - 7}{11} \times \dots$$
 فإن $= \frac{7 - 7}{11} \times \dots$

- الحد الأوسط في مفكوك $(1 + 7 7)^{1}$ هو
- (ه) المنوال للقيم: ٩، ٣٣، ٩، ٤، ٣٠، ٧ هو

$$\frac{r_-}{\circ} + \frac{r_-}{\circ} \times 7 + \Lambda \times \frac{r_-}{\circ}$$
 استخدم خاصیة التوزیع فی إیجاد قیمة :

- $\left(rac{\xi}{\epsilon}\right)$ أوجد عددين نسبيين يقعان بين $rac{\xi}{\xi}$ ، $rac{\xi}{\epsilon}$
 - $\frac{6}{4}$: $\frac{7}{4}$ + $\frac{7}{4}$ + $\frac{7}{4}$

(ب) الجدول الآتي يبين الدرجات التي حصل عليها ٤٠ تلميذًا في أحد الاختبارات:

1.4	۱۷.	١٦	١٥	18	الدرجة
	٩	. 17	١.	٠ ٤	عدر الثلاميد

مثل بيانات الجدول السابق بالخط المنكسر.

محافظة الدقهلية



ادارة السنبلاوين إلى المنافقيات صباحي الرياضيات صباحي

أجب عن الأسئلة الآتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- (١) الوسط الحسابي للقيم: ٣، ٥، ٤، ٨ هو
- (ب) ٥ (ج) (ب) ٤ (١٠)
 - $\cdots = \left| \frac{r}{1} \left| \frac{r}{r} \right| \right|$
- $\frac{\gamma}{\tau}(\omega) = \frac{1}{\tau} (\omega) \qquad (1)^{\tau} = \frac{1}{\tau} (\omega) \qquad ($
 - ·····= · , o (٣)
- $\frac{\circ}{\sqrt{2}}(a) \qquad \frac{\circ}{\sqrt{2}}(a) \qquad \frac{\circ}{\sqrt{2}}(a$
 - (٤) باقى طرح ٢٩ من ٥ ٩ هو
- (ب) ۲۸ (ب) ۴۸ (ب) ۴۸ (۱)
 - (ه) العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين 🐈 ، 🥱 هو
- $(-1) \frac{\gamma}{2} (-1) \frac{\beta}{2} (-1$

أكمل ما يأتي :

- (١) المنوال للقيم: ٣،٥،٣،٧،٣،٥ هو
- (٢) إذا كان ترتيب الوسيط لعدد من القيم هو الرابع فإن عدد هذه القيم
 - (٣) ٨ ص ٢ + ٢ ص = ٢ ص (٤ ص +)
- (٤) إذا كان الحد الجبرى : ٢ -0^{i+1} من الدرجة الخامسة فإن : i=1
 - (ه) إذا كانت : $-\omega + \frac{r}{V} = -\omega$ فإن : $V \omega = -\omega$
- - (ullet) استخدم خاصية التوزيع لإيجاد قيمة $rac{v}{V} imes rac{v}{V} + rac{o}{V} imes rac{v}{V}$

٧.(٤)



۱٫۳ ÷ $\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right)$ اختصر لأبسط صورة : $\left(\frac{1}{7} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right)$

(-1) اختصر لأبسط صورة : $(-0+7)^{2} - (-0+7)$ ثم أوجد قيمة الناتج عندما - 0 = ١

اوجد ناتج جمع: ٣-٠٠ ص + ع ، ٣ع - - س + ٢ ص

(ب) الجدول التالي يبين درجات ٣٠ تلميذًا في مادة الرياضيات:

Yo	۲.	10.	١.	٥	الدرجة
٦	· A	٧	0	٤	عدد الطلاب

(١) مثل البيانات السابقة بالأعمدة البيانية.

(٢) أوجد الدرجة المنوالية لهؤلاء التلاميذ.



توجيه الرياضيات

🔐 محافظة السويس

أجب عن النسئلة الأتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

أكمل ما يأتي :

<(i)

(۱) الحد الجبرى: ٣ ــ ص ص من الدرجة

(٢) الوسط الحسابي للقيم: ٢،٢،٣،٢،٧ هو

(٣) العدد النسبى الذي ليس له معكوس ضربي هو

(....+ " + " + " + " + " + " () + " () ()

(ه) ۱،۱،۲،۲،۲،۱،۱، ۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱۰۱)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(١) العدد النسبى - ٤ يكون موجبًا إذا كانت : - س صفر

≥(⇒) =(1) (پ)<

(٢) ترتيب الوسيط للقيم: ٦، ٢، ٥، ٤، ١ هو

۲(ب) ۲ (ب) ۲

 $(-) \qquad (-) \qquad (+) \qquad (+)$ (د) ع .

(٤) إذا كان المنوال للقيم: ٧ ، ٥ ، ص + ٣ ، ٥ ، ٧ هو ٧ فإن: ص =

(ج)

(پ) ٤ T (1)

(ه) أى مما يلى يساوى $\frac{\pi}{6}$ ؟

(ب) ۸٫۰ (ج) ۸٫۰۳ (ج) ۰٫۸۲ (ب) ۰٫۸۲ (۱)

 $\frac{r}{V} - 7 \times \frac{r}{V} + 7 \times \frac{r}{V}$: أي باستخدام خاصية التوزيع أوجد قيمة وجد أي التخدام خاصية التوزيع

(-) أوجد عجرد النظر حاصل ضرب: (-7 - -7) (۲ س + (-7) أوجد عجرد النظر حاصل ضرب (ب

🕹 (أ) أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين: 🝾 ، 🕆

(ب) اجمع: ٢ - ٠ - ٧ ص + ع ، ه ع + ٦ ص - ٢ - س

(١) أوجد خارج قسمة: ٢٠ ١٠ - ٢٠ ١٠ - ١٠ ١٠ - ١٠ ا الم (حيث ٢ - خ صفر)

(ب) الجدول التالي يبين توزيع درجات ٣٠ تلميذًا في أحد الاختبارات:

		•	- "					
المجموع	۱۷	10	١٢	٩	٦	الدرجة		
٣٠	٦	٥	٨	٧	٤	عدد التلاميد		

مثل هذه البيانات بالأعمدة البيانية ثم أوجد الدرجة المنوالية.

محافظة دمياط

مديرية التربية والتعليم توحيه الرياضيات

أجب عن الأسئلة الآتية : (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

آ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(۱) الحد الجبرى: ٣-ب ص من الدرجة

(1) الثانية. (ب) الثالثة. (ج) الخامسة.

(۲) باقی طرح (-۲ - س) من ٤ - س =

(۱) - ۲-س (ب) ۲-س (ب) ۲-س (ب) - ۲-س (ب) ۲-س (ب)

(د) السادسة.



إدارة دسوق توجيه الرياضيات

كالمحافظة كفر الشيخ

Market State of the State of th

أجب عن الأسئلة الأثية :

من بين الإجابات المعطاة:	الصحيحة	الإجابة	اختر	
--------------------------	---------	---------	------	--

(۱) إذا كان: $\frac{-u+7}{-v-0}$ عددًا نسبيًا فإن: $-u \neq \dots$

(۱) ه (ب) –ه (ج) صفر (۱) ۳– (1) ۳– (

٤٠٠ ١٠ =× × - ٢٥ ٥ (٢)

ですの(1) ですて(二) ですの・(4) とっちて(1)

(٣) الوسيط للأعداد : ٤ ، ٦ ، ٨ ، ٩ ، ٥ هو

(ب) ۸ (غ) ۸ (غ) ۸ (غ)

(٤) ۲ ، ۳ ، ۹ ، (بنفس النمط)

(۱) ۱۸ (ب) ۱۵ (ج) ۲۷

 $q + \dots + q = q(r + q)$ (o)

(۱) ۳ س (ب) ۲ س (ج) ۹ س (د) ۱۸ س

الكمل ما بأتى:

- (١) العدد النسبي الذي ليس له معكوس ضربي هو
- (٢) الوسط الحسابي للأعداد: ٣، ٦، ٣، ٨ هو
- (٣) أصغر عدد يمكن تكوينه من الأرقام ٢ ، ٥ ، صفر ، ٧ ، ٣ بدون تكرار هو

(٤) باقى طرح العدد ¹/₇ من ³/₇ هو

(ه) إذا كان المنوال القيم: ٣، ٧، ٦، ٧، ٦، ٠ ص هو ٧ فإن: - س =

ho استخدم خاصية التوزيع لإيجاد قيمة : ho imes
ho imes
ho imes
ho استخدم خاصية التوزيع لإيجاد المية المتخدم خاصية التوزيع لايجاد المتخدم

(ب) اجمع المقدارين: ٧ - س + ٥ ص - ٣ ع ، - س + ٣ ع - ٤ ص



(۳) العدد النسبى الذي يقع في منتصف المسافة بين $\frac{1}{7}$ ، $\frac{1}{7}$ هو(۳)

 $\frac{1}{Y}(2)$ $\frac{1}{Y}(2)$ $\frac{1}{Y}(2)$ $\frac{1}{Y}(2)$

إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الخامس فإن عدد هذه القيم

(ب) ۹(ج) ۲(ب) ۱۰(۲)

 $\circ : \Upsilon^-(\bot) \ \, (\ \, (\cdot)) \ \, (\ \, (\cdot)) \ \, (\ \, (\cdot)) \ \, (\cdot))$

🕜 أكمل ما يأتي :

- (١) العدد المحايد الجمعي في مجموعة الأعداد النسبية هو
- (٢) الوسط الحسابي للقيم : ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٥ ، ٣ هو
 - (۳) ۲،۱،۲،۲،۱، م،۸، ،..... (بنفس التسلسيل)
 - (ع) المنوال لمجموعة من القيم هو

(ه) إذا كان العدد النسبى $\frac{-v-y}{v+o} =$ صفر فإن : -v=

 $\frac{1}{7} - \Lambda \times \frac{1}{7} + 0 \times \frac{1}{7}$: استخدم خاصیة التوزیع فی إیجاد قیمة ما یأتی: $\frac{1}{7} \times 0 + \frac{1}{7} \times \Lambda = \frac{1}{7}$

(ب) اجمع المقادير الآتية : ٢ - س + ٢ ص - ٣ ، ٣ - س - ٤ ص - ١

(أ) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ١٥ ٢٠ س - ١٠ ٢٠ س + ٥ ٩ س

 (\mathbf{r}) إذا كانت : $\mathbf{r} = \mathbf{r}$ ، $\mathbf{r} = \mathbf{r}$ ، $\mathbf{r} = \mathbf{r}$ ، $\mathbf{r} = \mathbf{r}$) $\mathbf{r} = \mathbf{r}$ اوجد قيمة : $(\mathbf{r} - \mathbf{r}) \times \mathbf{s}$

اختصر لأبسط صورة : (-u - 7) (-u + 7) + 9

(ب) الجدول التالى يبين توزيع درجات ٣٠ طالبًا في أحد الاختبارات:

٩	٨	. V	٦	0	٤	الدجة
٣	٤	٨	٥	٧.	٣	عدد الطلاب

(١)مثل البيانات السابقة بالأعمدة البيانية.

(٢) أوجد الدرجة المنوالية لدرجات الطلاب.

(د)صفر

- $\frac{\circ}{\Lambda}$ ، $\frac{1}{V}$ ، أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين
- (ب) اقسم المقدار: ١٢ ١٨ ١٨ ٢٠ + ٦ س على ٢ س (حيث ٠٠ خ صفر)
 - (أ) أوجد حاصل ضرب : (٢ -٠٠ + ٥) (٢ -٠٠ ٥)
 - (ب) الجدول التالي يبين درجات ٣٠ طالبًا في أحد الاختبارات:

٤٠	70	۴.	Yo	۲	الترجة
. 0	٦	9	٧	٣	عدد الطلاب

مثل هذه البيانات بالأعمدة البيانية ثم أوجد الدرجة المنوالية.



إدارة مركز دمنهور توجيه الرياضيات - مسائي

محافظة البحيرة

أجب عن الأسئلة الأتية :

ا أكمل ما يأتي :

- (١) الوسط الحسابي لمجموعة القيم: ٣ ، ٨ ، ٢ ، ٧ هو
 - $\cdots = \frac{r}{s} \div \frac{o}{A} (r)$
 - (٣) باقى طرح ٢ -س من ٥ -س هو
 - (٤) المنوال للقيم : ٤ ، ٧ ، ٥ ، ٧ ، ١ هو
 - $(0) (7 \omega + 0)^{7} = 3 \omega^{7} + \cdots + 0$

🎁 إختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- $\cdots \cdots = {}^{\mathsf{Y}} \times {}^{\mathsf{Y}} \leftarrow {}^{\mathsf{Y}} = \cdots \cdots$
- (L) A ----(۱) ۲س^۱ (ب) ۲س^۱ (ج) ۸ س
 - (٢) الوسيط لمجموعة القيم: ٧ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٢ هو
 - (L) V (۱) ۳ (پ) ٤
 - (٣) درجة الحد الجيرى: ٣ ٣ ص مي هي
- (1) الثانية. (ب) الخامسة. (ج) السادسة. (د) الثالثة.

- $= \frac{0}{1 + 1}$ عددًا نسبيًا فإن : $0 \neq 1$
 - ۲(ب)
- $\frac{\xi}{qq}(z) \qquad \frac{\xi}{q}(z) \qquad \frac{\xi}{q}(z)$

(خ)−۲

- ر أ) باستخدام خاصية التوزيع أوجد قيمة : $\frac{\circ}{V} \times \Lambda \times \frac{\circ}{V} \times \Lambda$
- (ب) اجمع: ٥ -س + ٢ ص ٣ ، ٢ س ٧ ص + ٣
- (١) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ١٨ -س + ٦ -س ٣ -س
 - $\frac{\gamma}{(+)}$ أوجد عددين نسبيين يقعان بين : $\frac{\gamma}{0}$ ، $\frac{\gamma}{2}$
- $(7- \neq 0 2 + 1)$ اوجد خارج قسمة $(7- \neq 0 + 1)$ على $(7- \neq 0 + 1)$ اوجد خارج قسمة $(7- \neq 0 + 1)$
 - (ب)الجدول التالي يوضح درجات أحمد في امتحان الرياضيات في خمسة شهور:

-	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمبر	الثهر
	۲۰۰	٤.٥	٤٠	0+	٣.	الارجة

ارسم بيانيًا الجدول بالخط المنكسر.

محافظة المنيا

ادارة المنبا مدرسة السادات

۲-: :: ;

أجب عن الأسئلة الآتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

ان کان: $\frac{-\upsilon - \circ}{-v} \in \upsilon$ فإن: $-\upsilon \neq \cdots$

-1اِذَا کان: $(-1)^{2}(-1)^{2}=-1$

× = \frac{7}{4}(\frac{1}{2})

١٠(٠) ٢٥(٠) Vo(3) 0.(1)



إدارة أسيوط مدرسة السلام الإعدادية الثانوية المشتركة

🔏 🦠 محافظة أسيوط


أجب عن الأسئلة الأتية :

١ أكمل ما يأتي :

- (۱) المعكوس الجمعى للعدد $\left(-rac{1}{T}
 ight)^{
 m out}$ هو
- $10 \dots + 1 = (0 + \omega + 1) (7 \omega + 1)$
- (٣) إذا كان ترتيب الوسيط لجموعة من القيم هو الخامس فإن عدد هذه القيم هو
 - (٤) العدد النسبى الذي يقع في منتصف المسافة بين $\frac{1}{3}$ ، $\frac{6}{3}$ هو
- (ه) إذا كان المنوال القيم: ٧ ، ه ، ص + ٣ ، ه ، ٧ هو ٧ فإن: ص =

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- $1 = \cdots \times \Upsilon \frac{1}{\xi}$ (1)
- $\frac{1}{5} (1) \qquad \frac{r}{5} (2) \qquad \frac{r}{5} (4)$
- (٢) الوسط الحسابي لمجموعة القيم: ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٢ ، ٧ هو
- (د) ۲ (ب) ۲ (۲) ٥
- (٣) العامل المشترك الأكبر للمقدار : ٣ -0^7 ص 1 0 هو
 - (۱) س ص ۲ (ب) ۳ س ص
 - (ج) ٦ -س
 - (٤) باقى طرح (-ه س) من ٣ س =
- (۱) ۲ س (ب) ۸ س (ج) ۲ س (۱)
 - (ه) الشرط اللازم ليكون $\frac{V}{-V+0}$ عددًا نسبيًا هو -V
 - V(a) $\frac{V}{a}(a)$ o(a) o(b)



- $\sim \P(a) \qquad \qquad ((1))$
 - (٥) معامل الحد الجبرى : ٤ س ص فو
- Y(z) Y(z) Y(z)

👔 أكمل ما يأتي :

- باقی طرح $\frac{1}{0}$ من $\frac{7}{0}$ = …………
- (٢) العدد النسبي الذي ليس له معكوس ضربي هو
- (٣) الوسط الحسابي للقيم: ٦، ٣، ٤، ٧ هو
- (ع) إذا كان المنوال القيم: ٧ ، ٥ ، س ، ٧ ، ٥ هو ٧ فأن: ص =
 - (م) ۱ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۵ ، ۸ ، (بنفس التساسل)

$$(-)$$
أوجد خارج قسمة : $-0^{7} + 7 - 0 + 7$ على $-0 + 1$ (حيث $-0 \neq -1$)

باستخدام خاصية التوزيع أوجد قيمة :
$$\frac{3}{V} \times 0 + \frac{3}{V} \times \frac{7}{V} = \frac{3}{V}$$

$$\frac{V}{\Lambda} = \omega$$
 , $\frac{V}{2} = \omega = 0$

أوجد في أبسط صورة قيمة : (۱)
$$-\omega + \omega$$

ور أ) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى :
$$7 - 0^7 + 7 - 0^7 - 9 - 0$$

(ب) الجدول التالي يبين توزيع درجات ٣٠ طالبًا في أحد الاختبارات:

	المجموع	۱۷	10	17	٩	٦	الدرجة
i	٣.	٦	٥	. А	٧	٤	عدد التلاميذ

المطلوب: (١)إيجاد الدرجة المنوالية.

(١) تمثيل هذه البيانات بالأعمدة البيانية.

(c) 3



- $\frac{r}{V} 7 \times \frac{r}{V} + 7 \times \frac{r}{V}$: باستخدام خاصیة التوزیع أوجد قیمة ما یأتی باستخدام
- (ψ) اجمع المقدارين : $Y \omega V = \omega + \beta$ ، 'ه $\beta + \zeta = \chi \zeta$
 - $\frac{\gamma}{r}$ ، $\frac{1}{\gamma}$: أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين
- (-) أوجد خارج قسمة : $Y 0^{7} + 17 0 + 0$ على -0 + 0 (حيث $-0 \neq -0$)
 - (۱) اختصر لأبسط صورة : (۲۱ ۳) (۲۱ + ۲) + ۷
 - (ب) الجدول التالي يوضح درجات طالب في مادة الرياضيات خلال سنة دراسية :

أبريل	مارس	فبراير	ديسمير	نوفمير	أكتوير	الشهر
٤٥	٣.	Yo	٤٠	0 -	٣٥	الدرجة

مثل السانات بالخط المتكسر.



إدارة سوهاج توجيه الرياضيات

🥻 محافظة سوهاج

أجب عن الأسئلة الآتية :

ا أكمل ما يأتي :

- (١) الوسط الحسابي للأعداد : ٨ ، ٢ ، ٥ هو
- - $\binom{r}{r}$ المعكوس الجمعى للعدد $\frac{r}{s}$ هو
 - (٤) الحد الأوسط في المقدار $(Y \rightarrow u + 1)^Y$ هو
 - (ه) إذا كان: ٢ س = ٤ فإن: ٣ س = ············
 - اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
 - (١) الوسيط للقيم : ٦ ، ٨ ، ٧ هو
 - ٥(١) ٥ (١) ٥ (١) ٥ (١) ١ (١) ٥ (١) ١ (١) ١ (١) ١ (١) ١ (١) ١ (١)

- (۲) ۲۷، ۹، ۳ (بنفس التسلسل)
- ١٠٨(ع) مه (١٠) مه (١٠) مه (١٠)
 - (7) إذا كان: $\frac{7}{5} \times -\omega = 1$ فإن: $-\omega = 0$
 - رب) ۱ (ب) $\frac{\pi}{5}$ (i)
- (٤) الشرط اللازم لكى يكون <u>و عددًا نسبيًا هو ص لج</u>
- (٥) إذا كان المنوال القيم: ٧ ، ٥ ، حن + ٣ ، ٥ ، ٧ هو ٧ فإن: حس =
 - (۱) ۷ (ج) ۶ (ج) ۲ (۱) ۲
 - (۱) اجمع المقادير الجبرية الآتية : 3 w + 0 0 + 0 0 المحدم خاصية التوزيع في تسهيل إيجاد ناتج : $\frac{0}{V} + \frac{1}{V} \times \frac{0}{V} + \frac{1}{V} \times \frac{0}{V}$
 - ا أ) أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين العددين النسبيين : ﴿ * اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
 - (ب) أوجد خارج قسمة : ٢٥ -٠٠ + ١٥ -٠٠ على ٥ -٠٠ حيث -٠٠ +٠٠
 - (أ) حلل بإخراج ع.م.أ: ٣-٠٧ ٦-٠٠
 - (ب) فيما يلى درجات ٢٥ تلميذًا في أحد الاختبارات:

المجموع	١.	٩	٨	٧	٦	الدرجة
۲٥	7	٨	٥	٠.٤	۲	عدد التلاميذ

إدارة إسنا

توحيه الرباضيات

(١) مثل هذه البيانات بالأعمدة البيانية. (١) أوجد الدرجة المنوالية.



محافظة الأقصر

أحب عن الأسئلة الآتية :

- 🚺 أكمل ما يأتي :
- (۱) الشرط اللازم ليكون $\frac{\gamma - \upsilon}{\gamma + \upsilon}$ عددًا نسبيًا هو $-\upsilon \neq \cdots$
 - (١) الحد الجبرى : ٧ س من الدرجة

(*. w)	
	1150

and the second			100	:					:
71 at 3 A			٤٠٠			٠,٢		١.	64
(بنفس النمط)	***********	6		٠	6	-	•	÷	(٣)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			_	٠.		1		١.	

(٤) إذا كان : ٢٥٪ من عدد يساوى ٣٠ فإن العدد =

(ه) إذا كان المنوال القيم: ٧ ، ه ، ص + ٣ ، ه ، ٧ هو ٧ فإن: ص =

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(1) المعكوس الجمعي للعدد $\frac{7}{2}$ هو

 $\frac{\tau}{2} - (2) \qquad \frac{\sigma}{\tau} - (2) \qquad \frac{\tau}{2} \qquad (1)$

(٢) إذا كان الوسط الحسابي لدرجات خمسة طلاب هو ٣٠ درجة

فإن مجموع درجاتهم هو

(۱) ۲ (ب) ۱۵۰ ٣٥ (ع) ٣٠ (ع)

(٣) ترتب الوسيط للقيم: ٦ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ، ١ هو

(١) الأول. (ب) الثاني. (ج) الثالث. (د) الرابع.

(۱) ٢-س (ب) ٢-س (ج) ٢-س ص

(٥) العدد النسيي الذي ليس له معكوسًا ضربيًا هو

(د) ۲ (خ) ۱– (۱) ۱ (ب) صفر

(1 - 1) (1) ضع فی أیسط صورة: $(-1 - 1)^{7} + (-1 + 1)$

 (ψ) إذا كان: $\eta = \frac{\sqrt{1-2}}{2}$ ، $\psi = -\frac{1}{2}$ فأوجد قيمة : $\frac{\eta - \psi}{\eta + 1}$

 $\frac{0}{1V} + \frac{0}{1V} \times YV + V \times \frac{0}{1V}$ استخدم خاصية التوزيع في إيجاد قيمة : $\frac{0}{1V} + \frac{0}{1V} \times YV + V \times \frac{0}{1V}$

(ب) اجمع: ه ۲^۲ + ۲۲ – ۷ ، ۳۲ – ه ۲^۲ + ٤

(1) أوجد خارج قسمة: $Y - \sqrt{100} - 100 - 100 - 100 - 1000$ (حيث س ص ≠٠)

(ب) الجدول الآتي بين درجات أحمد في اختبارات أحد الشهور:

لغة إنجليزية	لغة عربية	علوم	دراسات اجتماعية	رياضيات	المادة
۳۲۰۰۰	۳۸	٣٥	0 -	. ٤٠	الدرجة

مثل بيانيًا هذه الدرجات باستخدام الخط المنكسر.

ي محافظة حنوب سيناء



V(¬)

0(1)

مديرية التربية والتعليم إدارة طور سيناء

أجب عن الأسئلة الآتية :

🚺 أكمل ما يأتي :

- $\lambda = \cdots \times \frac{\lambda}{2}(1)$
- (۱)الحد الحدري: ه س ص من الدرجة
- (٣) الوسط الحسابي للقيم: ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٨ هو
 - $/ \dots = \frac{\gamma}{\zeta}(\xi)$
 - × T = T T(0)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(١) المنوال للقيم: ١ ، ٣ ، ٧ ، ٣ ، ٧ ، ٣ ، ٧ هو

(ج) (ب)۳ و د ۲

(7)اندا کان : $\frac{7}{6} = \frac{-0}{4}$ فإن : $-0 = \frac{-0}{4}$

١٠(٤) (ب) ۲(١)

 $\cdots\cdots\cdots = {}^{\prime} \circ {}^{$

 $(-1)^{2} - (-1)^{2}$

(٤)الوسيط للقيم : ١ ، ٧ ، ٢ ، ٥ ، ٤ هو

(ب) **\(i)**

(ج)ع

..... = | Y | - | Y- |(o)

(ب) ٤-(١)

Y(3) (ج)صفر

 $Y = \xi$ ، $\frac{1}{2} = \xi$ ، $\frac{1}{2} = \xi$ ، $\frac{1}{2} = \xi$

فأوجد القيمة العددية للمقدار : -v - (-w + 3)

· مفاهيم ومهارات أساسية تراكمية في الجبر والإحصاء ·

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}$$

$$\frac{111}{V} (\iota) \frac{2}{\sqrt{3}} (\iota) \frac{11}{\sqrt{3}} (\iota) \frac{11}{\sqrt{3}}$$

$$(i) \ \lambda, \cdot \qquad (\psi) \ \Gamma, \cdot \qquad (\varphi) \ \ 70, \cdot \qquad (L) \ \ 07, \cdot$$

(ه) أى مما يلى طريقة صحيحة للحصول على ناتج:
$$\frac{1}{7} - \frac{1}{3}$$
 ؟

$$\frac{3-7}{1-2}(2) \qquad \frac{3-7}{1-2}(2) \qquad \frac{3-7}{1-2}(2) \qquad \frac{3-7}{1-2}(3)$$

(٦) أي من هذه الجمل صحيحة ؟

۱۰۰ من
$$0 = 0 \cdot \lambda$$
 من $0 = 0 \cdot \lambda$ من $0 = 0 \cdot \lambda$ من $0 = 0 \cdot \lambda$

(۸) إذا كان نصف عدد هو ۳۰ فإن :
$$\frac{7}{3}$$
 هذا العدد يساوى



(أ) اختصر لأبسط صورة:

(ب) أوجد ناتج عملية الضرب الآتية:

(ب) الجدول التالي يبين توزيع درجات ٣٠ تلميذًا في أحد الاختبارات:

المجموع	1٧	10	١٢	٩	٦	النرحة
٣٠		٥	٨	٠ ٧	٤	2.200 M 2.02

مثل هذه البيانات بالخط المنكسر.

امتحانات بعض مدارس المحافظات في الجبر والإحصاء



إدارة عين شمس توجيه الرياضيات

محافظة القاهرة

أجب عن الأسئلة الأتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 🕦 درجة الحد الجبرى: ٣ -س ص مى
- (١) الأولى. (ب) الثانية. (ج) الثالثة. (د) الرابعة.
 - () إذا كان المنوال للقيم: ١٥ ، ٩ ، · + ١ ، ٩ ، ١٥ هو ٩
 - فَإِن : ﴿ =
 - ١٥ (١٥) ٧ (ج) ٨ (١١) ٨ (١١)
 - الخاصية المستخدمة في إجراء العملية : $\frac{r}{V} \times I = \frac{\dot{r}}{V}$ هي
 - (1) الدمج. (ب) الإبدال.
 - (ج) المحايد الضربي. (د) المعكوس الجمعي.
- (٤) إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الرابع فإن عدد القيم هو
 - ٤ (ب) ٩ (ج) ٥
 - أكبر الأزمنة الآتية هو
 - (١) ٣٦٠٠٠ ثانية. (ب) ٩٠٠ دقيقة. (ج) ١٣ ساعة.

📆 أكمل ما يأتي بالإجابة الصحيحة :

- باقی طرح ه ص من ۳ ص یساوی
- العدد النسبى الذي يقع في منتصف المسافة بين العددين : $\frac{0}{7}$ ، $\frac{7}{7}$ هو
 - $\cdots\cdots\cdots {}^{\mathsf{Y}}_{\mathsf{U}} = (\circ \mathsf{U}_{\mathsf{U}}) (\circ + \mathsf{U}_{\mathsf{U}}) (\mathsf{P})$
 - $\cdots = \frac{1}{Y} + \left| \frac{\gamma}{Y} \right|$
 - الوسط الحسابي للأعداد: ٥ ، صفر ، ١١ ، ٨ ، ٦ هو

(L) - 1 - (J)

- \mathbb{T} (أ) أوجد ناتج جمع المقدارين الآتيين : ٥ 0 + 0 0 0 0 + 0
 - (ب) اختصر لأبسط صورة: (٢ -س ١) + ٤ -س $\frac{1}{V} = 0$ عندما حن ثم أوجد القيمة العددية للناتج: عندما
 - وجد خارج قسمة المقدار الجبرى : ٩ -س ص $+ 7 m^2$ $= 7 m^2$ $= 7 m^2$ على الحد الجبرى: ٣ -س ص (حيث -س ص لح صفر)
 - $\frac{\circ}{V} V \times \frac{\circ}{V} + V \times \frac{\circ}{V} + V \times \frac{\circ}{V}$ باستخدام خاصیة التوزیع أوجد ناتج :
 - ص ٤ ٢ص ١٢ : الأعلى المشترك الأعلى : ١٢ ص ص ع ص
 - (ب) إذا كان الوسط الحسابي لدرجات خمسة طلاب هو ٣٠ فأوجد مجموع درجاتهم.



إدارة التبين توجيه الرياضيات

محافظة القاهرة

أجِب عن الأسئلة الأتية :

ا أكمل ما يأتي:

- (بنفس التسلسل) ۸۰۰، ۳۰۲، ۱۰۱ (بنفس التسلسل)
- (٢) العدد النسبى الذي ليس له معكوس ضربي هو
 - = | 7 | | 0- | (7)
- (٤) الوسط الحسابي لمجموعة القيم: ٢ ، ٣ ، ٤ ، ١ ، صفر يساوي
 - فإن المنوال للقيم : ٦ ، ه ، ك + ١ هو ٦ فإن : 6

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- $\frac{r}{\sqrt{-}} = \cdots \times \frac{r}{\sqrt{1-r}}$
- $\frac{\gamma}{r}$ (\Rightarrow) γ (φ) γ (\uparrow)
- (د) ا
- ﴿ إِذَا كَانَ تِرْتِيبِ الوسيطِ لمجموعة من القيم هو ٤ فإن عدد هذه القيم يساوى
 - ٧ (ج) ٥ (ب) ٤ (١) ۳ (۵)

 - المعكوس الضربي للعدد $\frac{7}{8}$ ۱ هو \mathbb{R}
 - (-1) $\frac{7}{7}$ (-1) $\frac{7}{7}$

- (٤) باقى طرح ٥ ٠٠٠ من ٣ ٠٠٠ هو
- (۱) ۲ س (پ) ۲ س (ج) ۸ س
 - ص × سس × س × ۲۰۰۰ من مس × سس × ۱۲ مس
- (د) ۲ س^۳ ص (۱) ٢-س ص (ب) ٢-س٣
 - $\frac{\circ}{1}$ باستخدام خاصیة التوزیع أوجد ناتج: $\frac{\circ}{1}$ + $\frac{\circ}{1}$ + $\frac{\circ}{1}$ باستخدام خاصیة التوزیع
 - (ب) أضف: ٥ ٢ + ٢ س ٦ إلى ٣ س + ٤
 - وَ أَ) أُوجِد ثلاثة أعداد نسبية بين: ٥٠ ، ٢٠ بحيث يكون بينهم عددًا صحيحًا
- $Y = \omega 1$ عندما عندما أوجد قيمة الناتج: عندما عندم
 - (أ) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ حل
- (ب) احسب الوسط الحسابي ، الوسيط ، المتوال للقيم : ٧ ، ٤ ، ٣ ، ٣ ، ٣ ، ٤ ، ٤



(د) السادسة.

K(7)

ادارة مصر الحديدة توجيه الرياضيات

محافظة القاهرة

أجب عن الأسئلة الاتية :

- اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
- () الحد الجبرى : ٢ -س^٢ ص^٣ من الدرجة
- (ج) الخامسة. (أ) الثانية. (ب) الثالثة.
- اِذَا کَانَ : $\frac{-v v}{v + v}$ عددًا نسبيًا فإن :
- ٣ (٤) (ج) ۲ (۱) ۲– (پ)
 - \mathfrak{P} المعكوس الجمعى للعدد $\left|\frac{-Y}{T}\right|$ هو
- $\frac{7}{7} (2) \qquad \frac{7}{7} (2) \qquad \frac{7}{7} (2)$
- (3) إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة القيم: ١ ، ٤ ، ٢ ، ٣ ، ٢ ، ٢ -س هو ه
 - فإن : سِ =
 - (ج) ه (ب) ٤





إدارة منشأة القناطر توجيه الرياضيات

محافظة الجيزة

أجب عن الأسئلة الآتية :

🚺 أكمل ما يلي :

العدد : $\frac{-\upsilon + v}{-\upsilon - o}$ يعبر عن عدد نسبى بشرط $-\upsilon \neq \cdots$

(٧) الوسط الحسابي للقيم: ٣، ٨، ٢، ٧ هو

(٤) باقى طرح ٣ - من حن هو

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

 الدرجة	ص من	۲ س۳	الجيرى :	(١) الحد
. •	_	_		. •

(۱) الثانية. (ب) الثالثة. (ج) الرابعة. (د) السادسة.

۲ کس ۲ × کس ۲ کس ۲

(۱) ٢-٠٠ (ب) ٨-٠٠ (ج) م-٠٠ (١)

٣ الوسيط للأعداد : ٤ ، ٦ ، ٩ ، ٨ ، ٥ هو

 $\Upsilon(1)$ $\Upsilon(2)$ $\Upsilon(3)$ $\Upsilon(1)$

إذا كان المنوال لجموعة القيم: ٧ ، ٨ ، - ٠ - ١ هو ٨ فإن: - ٠ =

 $\Lambda(\varphi)$ $\Lambda(\varphi)$ $\Lambda(\varphi)$ $\Lambda(\varphi)$

المعكوس الضربي للعدد ٢ هو

 $\frac{1}{4}(7)$ $\frac{1}{4}(7)$ $\frac{1}{4}(7)$ $\frac{1}{4}(7)$ $\frac{1}{4}(7)$

(ب) اجمع المقدارين: ٤ -س + ٣ ص + ه ، ٢ -س + ص - ه

() باقی طرح -٧ - س من ٥ - س يساوى

(۱) - ۲ س (ب) ۲ س (ج) - ۱۲ س (۱) ۲ س (۱۲ س

ا أكمل:

 $1 = \cdots \times 7 \frac{1}{7}$

فإن : م =

٣ المتوال للقيم : ٢ ، ٥ ، ٨ ، ٢ ، ٥ ، ٤ ، ٥ هو

إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الرابع فإن عدد هذه القيم يساوى

(بنفس النمط) (بنفس النمط)

 $\left(rac{r}{V}ight)+\left(rac{r}{V}ight) imes$ ه + $\left(rac{r}{V}ight) imes \Lambda$: وأ أ باستخدام خاصية التوزيع أوجد ناتج

 (ψ) اجمع المقدارين: ٦ - ψ^{Y} + ϕ^{Y} - ϕ - ϕ - ϕ - ϕ

ثم أوجد القيمة العددية للناتج: عندما -0 = 1 ، -0 = -7

 $1 \frac{1}{2}$ (أ) إذا كان: $-\infty = -\frac{1}{7}$ ، $\infty = \frac{7}{3}$ ، $3 = \frac{7}{3}$) أوجد قيمة: $-\infty = -3$

(-) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ١٥ - ح 3 + ٦ - $^{\circ}$ ح 7 ح 7

(1) اختصر: $(-\omega - 7)$ $(-\omega + 7)$ $(-\omega - 2)$ + 3 س

(-) الجدول الآتى يبين درجات أعمال السنة لأحد التلاميذ فى إحدى المواد الدراسية خلال عام دراسى :

أبريل	مارس	فبراير	ديسمبر	نوقمبر	أكتوبر	الشهر
۲۷	72	72	۲٧	۲٥	77	الدرجة

من البيانات احسب متوسط درجات أعمال السنة لهذا التلميذ.



- ر أ) أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين : $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ، $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (-) اختصر لأبسط صورة : (-0+0) (-0-0)+0 ثم أوجد قيمة الناتج : عندما -0=0
- (ب) إذا كان الوسط الحسابي لأطوال أضلاع مثلث يساوي ٧ سم فأوجد محيط هذا المثلث.



أجب عن الأسئلة الآتية :

🚮 اختر الإجابة الصحيحة من بين الآجابات المعطاة:

- الشرط اللازم ليكون العدد : $\frac{V}{V-V}$ عددًا نسبيًا هو $-U \neq V$
- (۱) ۲ (ب) ۲ (ج) ۲-(د) صقر $(Y) \land C^{Y} = 3 \leftarrow \times$
- (۱) ۲ ح (ب) ۲ ح (ج) ٤ ح٢ (د) ٤ حـ
 - (٣) الوسيط للقيم: ١٤ ، ٢٣ ، ١٠ ، ٣٢ ، ٩ هو
- ٣ (ع) ٣٢ (ب) ٦ (١) 18 (2)
 - (٤) الحد الجبرى: ٦ ح ب من الدرجة
- (1) السادسة. (ب) الثانية. (ح) الثالثة. (د) الخامسة.
 - (ه) إذا كان: $\frac{\pi}{2}$ π =
 - \circ (\cdot) $\frac{7-}{\circ}$ (i)<u>د</u> (ج) T (1)

أكمل ما يأتي :

- ر) إذا كان: $-\omega + \frac{0}{V} =$ صفر فإن: $V \omega =$
- (٧) المنوال للقيم: ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٣ ، ٤ ، ٣ ، ٥ هو
 - (٣) العدد الذي ليس له معكوس ضريى هو
 - $10 \dots + 7 \longrightarrow 7 = (0 + 0) (7 0) (2)$
 - (ه) ۱۵ ٪ من ٤٠ =

- (1) اطرح: ٤ س + ٩ س ٥ من ٢ س ٥ ٥
- (\cdot,\cdot) باستخدام خاصية التوزيع أوجد قيمة : $rac{\circ}{\mathsf{V}} imes \circ + rac{\circ}{\mathsf{V}} imes \circ 1 \circ rac{\circ}{\mathsf{V}}$
- راً) اختصر : (1-0) (1+0) + 0 ثم أوجد القيمة العددية للناتج : عندما $1=\frac{1}{2}$
 - (-) أوجد خارج قسمة : ۲ $(-)^{7}$ $(-)^{7}$ على $(-)^{7}$ (حيث $(-)^{7}$
 - $\frac{\circ}{\Lambda}$ ، $\frac{1}{\lambda}$: $\frac{1}{\lambda}$: $\frac{1}{\lambda}$ $\frac{\circ}{\lambda}$ $\frac{1}{\lambda}$ $\frac{\circ}{\lambda}$
 - (ب) إذا كان المنوال للأعداد : $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{7}$ ، $\frac{1}{6}$ ، $\frac{1}{7}$ هو $\frac{1}{7}$ فأوجد : قيمة حس



توجيه الرياضيات - الفترة الصباحية

أجب عن الأسئلة الأتية :

محافظة الإسكندرية

- اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
- الحد الجيرى : ٢ س ص من الدرجة ()
- (1) الثانية. (ب) الثالثة. (ج) الرابعة. (د) الخامسة.
- $\frac{\vee}{\circ} \neq \smile (-)$ $\circ \neq \smile (-)$ $\circ \neq \smile (1)$ (c) ~∪ ≠ ∨
 - (٣) الوبسيط للقيم : ٢ ، ٨ ، ٣ ، ٥ ، ٧ هو
 - (د) ۷ (ز) ۲ (ج) ه

 - عن الله على على عن الله عن الله عن عن الله عن الله
 - $\frac{\pi}{6} (7) \qquad \frac{\pi}{4} (7) \qquad \frac{\pi}{6} (1)$
 - (6) المنوال للقيم: ١ ، ٣ ، ٧ ، ٣ ، ٧ ، ٣ ، ٧ ، ٣ هو
 - V(i) (ج) ٢ ۲ (پ) ۱ (۱)

الكمل ما يأتي:

- اِذَا كَانَ : $\frac{20}{37} = \frac{6}{77}$ فإن : $\frac{20}{37} = \frac{6}{77}$
- 😙 الوسط الحسابي للقيم : ٣ ، ٥ ، ٤ ، ٩ ، ٤ هو



- $1Y \dots + Y \longrightarrow Y = (\xi + \omega) (Y \omega Y) (Y)$
- (٤) العدد النسبي الذي ليس له معكوس ضربي هو
 - (۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، (بنفس التسلسل).
- (1) اختصر لأبسط صورة : $(-u + Y)^{2} (-u + Y)$ (س ۲)
 - (ب) إذا كان: س = ٣ ، ص = ٥ فأوجد في أبسط صورة قيمة المقدار : $\frac{-\omega - \omega}{-\omega + \omega}$
- (أ) اقسم: ٢٠٠٠ ب ٢٠١٠ ب ٢٠١٠ ب على ٥٩ ب
- $\frac{r}{V} 7 \times \frac{r}{V} + 7 \times \frac{r}{V} + 7 \times \frac{r}{V}$ باستخدم خاصية التوزيع في إيجاد قيمة المقدار :
 - (- حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى : ۲۷ س 3 ۱۸ س 7
- (أ) أوجد مجموع المقدارين الآتيين: ٣ س ٤ ص + ٢ ، -٣ س + ٧ ص + ٣
 - (-) إذا كان الوسيط للقيم $-\omega + 0$ ، $-\omega + \pi$ ، $-\omega + \Lambda$ هو $-\omega$ فأوجد: قدمة -س



إدارة بنها

محافظة القليوبية

أجب عن الأسئلة الآتية :

- 🚺 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :
- (١) الحد الجبرى : ٢ ٢ ب من الدرجة
- (ب) الثالثة. ﴿ جِ) الرابعة. (أ) الثانية.
- (د) الخامسة.

 - - - (+) (ب) صفر (+)
- ٣ العدد عدد نسبي موجب.
- (۱) | ۲- | (۱) $\frac{\lambda}{L} - (\dot{\Rightarrow})$
- (د)صفر

1-(2)

- (پ) ۲
- (L) 3 (ه) إذا كان المنوال القيم: ٧ ، ٥ ، ص + ١ ، ٧ ، ٥ هو ٥ فإن: ص =

(2) إذا كان: $(-0 + 1)^7 = -0^7 + 10 - 0 + 10$ فإن: $(0 + 10)^7 = -0^7 + 10$

- (د) ع
 - (۱) V (۱)
 - 📆 أكمل ما بأتي :
 - ۲٤ من عص = ا من عص × سسسس
 - 😙 الوسيط للقيم : ۷ ، ۹ ، ۲ ، ۱۳ ، ه هو
 - Υ انا کان: $\frac{-\upsilon}{2} = \frac{\gamma}{\pi}$ فإن: $\frac{\gamma-\upsilon}{2} = \cdots$
 - (٥) الوسط الحسابي للأعداد: ٢ ، ٦ ، ٤ ، ٨ ، ٥ هو
- (أ) اطرح: س ٥ س ص + ص من ٢ س س ص + ٤ ص
- (\cdot) استخدم خاصية التوزيع في إيجاد ناتج : $\frac{3}{4} imes 11 imes \frac{2}{4} imes 11 imes 11$
 - (أ) اختصر لأبسط صورة : (س ٥) (س + ٥) + ٢٥

ثم أوجد القيمة العددية للناتج: عندما س = -١-

(ت) أوجد خارج قسمة:

۱۲ - س + ۱۸ - س علی ۲ - س (حیث - س لح صفر)

- (ج) اجمع: ٣-س-٢ص+٥، ٢ص+٤-س-٣
 - $\frac{r}{s}$ ، $\frac{r}{r}$ ، وجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين : $\frac{r}{r}$ ، $\frac{r}{s}$
- (ب) الجدول التالي يوضح درجات ١٠ تلاميذ في أحد الاختبارات.

١.	٩.	٨	٧	٦	٥	الدرجة
۲	٤	٠ ٩	٧	٥	٣	عدد التلاميذ (التكرار)

أوجد المنوال للدرجات.





إدارة منيا القمح توجيه الرياضيات - ثموذج (ب)

محافظة الشرقية

أجب عن الأسئلة الآتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- (الوسيط للأعداد : ٢ ، ٥ ، ٤ ، ٦ ، ٣ هو
- (ι) (ι) (ι) (ι)
- 1-(a) $\frac{\gamma}{\gamma}(a)$ (a) $\frac{\gamma}{\gamma}(b)$
- $\Upsilon(z) \qquad \qquad \Upsilon(z) \qquad \qquad \Upsilon(t)$
- لعدد الذي يقع في منتصف المسافة بين العددين : $\frac{1}{5}$ ، $\frac{\pi}{5}$ هو
 - $\frac{1}{3} (1) \frac{1}{3} (2) \qquad (2) \frac{1}{3} (3)$
- إذا كان المنوال للأعداد : ٥ ، + ٢ ، ٤ ، ٢ ، ٩ هو ٦ فإن : =
 - (۱) ۲ (ب) ۲ (۲) ۲ (۲)

👔 أكمل ما يأتي :

- 1 =× ½ ①
- $\frac{Y}{o}$ يزيد عن $\frac{Y}{o}$ بمقدار
- العدد النسبى $\frac{7-v}{V+v}$ يساوى صفر عندما v=0
 - (٤) الحد الجبرى: ٣-٠٠ ص ع من الدرجة

استخدم خاصية التوزيع في إيجاد قيمة : $\frac{2}{9} \times 11 \times \frac{2}{9} \times 7 \times \frac{2}{9}$

 $\frac{7}{8}$ ، $\frac{7}{8}$: أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين العددين (ب)

- (ب) إذا كان المنوال لمجموعة القيم: ١٥ ، ٩ ، ١٠ ، ٩ ، ١٥ هو ٩ فأوجد: قيمة س

ادارة قويسنا

توجيه الرباضيات



محافظة المنوفية

أجب عن الأسئلة الآتية :

- اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
- () درجة الحد الجبرى: ٢ -س³ ص هي
- (1) الثانية. (ب) الرابعة. (ج) الخامسة. (د) السادسة.

 - $\frac{\gamma}{\gamma}(1) \qquad \frac{\gamma}{\gamma}(2) \qquad \frac{\gamma}{\gamma}(1)$
 - 🍞 الوسيط للقيم: ٥، ٣، ١٠، ٨، ١٠ هو
 - ١٠ (١) (ج) ۸ (ج) ۱١ (١)
 - ٤) باقى طرح ٢ س من ٥ س هو
 - (۱) ۲- (۱) (ج) ۲- (ب) س ۲- (۱) س ۲- (۱) است (۱) ۲- س ۲- (۱)
 - إذا كان: (س ٥) (س + ٥) = س + ك فإن: ك =
 - (د) ۲۰ (ج) مفر

أكمل ما يأتي:

- انا كان العدد النسبى $\frac{-v-v}{v-v} = صفر فإن: -v = \dots$

- (٤) العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين العددين ٥ ، ٢ مو
 - (۲ س + س) ÷ س = (حیث س ≠ صفر)
 - T = 2 ، $\frac{T}{2} = 0$ ، $\frac{1}{2} = 0$. $\frac{1}{2} = 0$ أوجد في أبسط صورة قيمة المقدار: س ص – ص ع
 - (\cdot) استخدم خاصية التوزيع في إيجاد قيمة : $\frac{\circ}{\sqrt{}} \times \sqrt{+} \times \frac{\circ}{\sqrt{}} \times \times + \frac{\circ}{\sqrt{}}$
 - (ج) اجمع: ١٩٢٤ع ٥ ح ، ١ ٢ ٢ ح
- 1 1 = 0 أوجد في أبسط صورة : $(-0.7)^{1+1} + 1 0.00$ ثم أوجد قيمة الناتج : عندما -0.00
- () إذا كانت مساحة المستطيل هي : () + () + () + () وطوله يساوى () + (
 - (أ) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ١٢ ٢ س ١٨ م ٢٠ ١ م م
- (ب) إذا كان المنوال للقيم: ٢ + ٢ ، ٢ + ١ ، ٢ + ٢ ، ٢ + ٢ يساوي ١٨ فأوجد: قيمة ٢



إدارة شرقَ طنطا توجيهالرياضيات-الفترةالصباحية

محافظة الغربية

أجِب عن الأسئلة الاتية :

- (١) أكمل ما يأتي : = | V | + | Y- | (1)
- (۲) الحد الجبرى: -۳ س^۲ ص^۲ معامله يساوى
- $\cdots\cdots\cdots = (\xi + \psi) (\xi \psi$
 - العدد $-\frac{3}{V}$ معكوسه الجمعى هو
 - (a) الوسيط القيم: ٧ ، ٨ ، ٦ ، ٩ ، ٥ هو
 - اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
 - 🕥 مربع مجموع الحدين ۴ ، ب هو
- (i) 19 + P Y (a) (c) (c) (c) (d)

- (٢) الشرط اللازم ليجعل العدد : $\frac{3}{-0+3}$ ليس نسبيًا هو
- $\xi \neq \omega (1)$ $\xi = \omega (1)$ $\xi \neq \omega (1)$
 - الوسط الحسابي للقيم: ٨ ، ٤ ، ١٢ ، ١ ، ٥ هو
 - (ټ) ۷ (ټ) ۸ (ټ) ۸
 - $\frac{\circ}{r}(1) \qquad \frac{r}{r}(\dot{\varphi}) \qquad 1(1)$
- إذا كان المنوال للقيم: ٧ ، ٥ ، ٢ ٠٠ + ٣ ، ٥ ، ٧ هو ٥ فإن: ٠٠٠ = ٠٠٠٠
 - (ب) ۲ (ب) Y-(2)
 - (۱) اجمع: ۲ ص + ه س ۱ ، ۲ س ه ص + ۳
 - (-,) أوجد خارج قسمة : $Y 0^{-1} 0 0^{-1} 10 0 10$ على $Y 0 0^{-1}$ $\left(\frac{\varphi}{\varphi} - \neq 0\right)$ (حيث : صَب φ
 - (۱ أ) اختصر لأبسط صورة : $(-\infty + 1)^{1}$ $(-\infty + 1)$
 - (-7) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى : 77(1-7) 7-7 ب (1-7)ثم أوجد القيمة العددية للناتج: عندما |1-Y-1|
 - $\frac{7}{\sqrt{7}} 7 \times \frac{7}{\sqrt{7}} + 7 \times \frac{7}{\sqrt{7}}$ استخدم خاصیة التوزیع فی إیجاد ناتج: $\frac{7}{\sqrt{7}} \times 7 \times 7 \times 7 = \frac{7}{\sqrt{7}}$
 - (ب) احسب الوسط الحسابي ، الوسيط ، المنوال للقيم الآتية :

10. 4. 2. 0. 1. 4. 4

محافظة الدقهلية

توجيه الرياضيات-الفترة المسائية

أجب عن الأسئلة الاتية :

- أكمل العبارات الآتية:
- (١) العدد النسبي الذي ليس له معكوس ضربي هو
- ﴿ الوسط الحسابي للقيم: ٢، ٥، ٤، ٩، ٤ هو

- $(-0.0+0.0)^{T}=0$ إذا كان: $(-0.0+0.0)^{T}=0$ هان: -0.00=0.00
 - ك العدد النسبى الذي يقع في منتصف المسافة بين العددين : $rac{1}{X}$ ، $rac{\delta}{\Lambda}$ ، هو
 - (الناكان: (س ص) (٣ س + ٢ ص) = ٣ س + ك س ص ٢ ص ٢ ص

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- إذا كان المنوال لمجموعة القيم: ٧ ، ٥ ، ص + ٣ ، ٥ ، ٧ هو ٧ فَإِنْ : ص =
- (ب) ٤ (1) ۳ · A (7)
 - الحد الجبرى: ٢ ٣ ص من الدرجة
- (1) الثانية. (ب) الثالثة. (ج) الرابعة. (د) الخامسة.
 - \mathfrak{P} إذا كان : $\frac{\mathsf{V}}{\mathsf{V}}$ عددًا نسبيًا فإن : V
 - (1) (-1) (-1)
 - إذا كان الوسيط للقيم: ك + ٣ ، ك + ٢ ، ك + ٤

حيث ك عدد صحيح موجب هو ٨ فإن : ك =

- (ب) ۲ (ب) ۲ (۱) ۲ (۱) ۲ (۱) ۲ (۱) ۲ (۱) ۲ (۱)
- (۱) صفر (ب) ۱ (ج) ۲
- (أ) اطرح: ٥ س ۲ + ص ۲ ۳ س ص من س ۲ ۲ س ص + ۳ ص ۲
 - $\frac{\gamma}{2}$ ، $\frac{\gamma}{2}$: نين تقع بين أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين أوجد ثلاثة
 - $\frac{r}{V} \frac{V}{V} \times \frac{r}{V} + \frac{o}{V} \times \frac{r}{V} : \frac{o}{V} \times \frac{r}{V} \times \frac{v}{V} \times \frac{v}{V} \times \frac{v}{V}$ استخدم خاصیة التوزیع فی إیجاد قیمه :
 - (-1) اختصر لأبسط صورة : $(-0+7)^{2}$ (-0+7) (س + ۲)

- $^{\circ}$ (1) اقسم : ۱۲ س $^{\circ}$ ۹ س $^{\circ}$ + $^{\circ}$ س علی $^{\circ}$ س $^{\circ}$ رحیث پر $^{\circ}$
 - (ب) الجدول التالي يبين توزيع درجات ٣٠ تلميذا في أحد الاختبارات:

المجموع	> 18	١٥٠	١٢	1	٦	الدرجة
۲.	7	0	. A	٧	٤	عدد التلاميذ

توجيه الرياضيات

أوجد عدد التلاميذ الحاصلين على درجة أكبر من الدرجة المنوالية.



محافظة الإسماعيلية

أجب عن الأسئلة الآتية :

🚺 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- $\frac{\pi}{4}$ (7) (1) (ب) صفر (2)
 - 😗 الوسيط لجموعة القيم : ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٣ ، ١١ هو
- (۱) ه (ب) 7 (2) (ج) ۷
 - { o . . . } o 🕎
- **⊅**(2).
 - ٤) الوسط الحسابي لمجموعة القيم: ٦، ٤، ٣، ٤، ٨ هو
- V(7) (۱) ٤ (ټ) ه (ټ) ٤
- إذا كان الحد الجبرى: -س ص من الدرجة السادسة فإن: م = -----
 - m (1) ١ (ټ) ٢ (ټ) ۲

🚹 أكمل العبارات الآتية :

- (المنوال لمجموعة القيم: ٣ ، ٤ ، ٣ ، ٤٤ ، ٥ هو
- (۲) الحد الأوسط في مفكوك : $(-u o)^{Y}$ هو
- 🌱 العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين : 👌 ، 🤻 هو
 - (٤) العدد الذي ليس له معكوس ضربي هو
 - (٥) أصغر عدد طبيعي هو

Y-w-(1)

(د) الصفر

- $\frac{\circ}{1}$ باستخدام خاصیة التوزیع أوجد ناتج : $\frac{\circ}{1}$ \times ۱۰ \times $\frac{\circ}{1}$ \times ۲۳ \times $\frac{\circ}{1}$
 - (ب) أوجد عددين بين: ﴿ ، ﴾ أحدهما نسبى والآخر صحيح،
 - $\left(\stackrel{\bullet}{\Rightarrow}\right)$ أوجد قيمة : $\left(\frac{\gamma}{\gamma} + \frac{\gamma}{\gamma}\right) \times \left(\frac{\delta}{\gamma} + \frac{\gamma}{\gamma}\right)$
 - (۱) اجمع: ٣ س + ه ص ١ ، ٢ س ٧ ص + ١
- (ب) أوجد خارج قسمة: ١٥ ١٠ ٢٠ ٠٠ على ٥ س (حيث حن خصفر)
 - (ج) حلل بإخراج العامل المشترك : -س (ل + م) + ص (ل + م)
 - ثم أوجد قيمة المقدار : عندما $-\omega + \omega = 0$ ، $\omega + \omega = 0$
 - (1) (1) اختصر لأبسط صورة : (-0+7) (-(-0+7)) (-(-0+7))
 - (ب) إذا كان المتوسط الحسابى لمجموعة من القيم يساوى ١٥ ومجموع هذه القيم يساوى ١٠ فأوجد عدد القيم.



إدارة دمياط وجيه الرياضيات

محافظة دمياط 🛸

أجب عن الأسئلة الاتية :

- اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
- الخاصية المستخدمة في إجراء العملية : $rac{7}{V} imes 1 = rac{7}{V}$ هي خاصية
 - (١) الدمج. (ب) الإبدال.
 - (ب) الإبدال.
 - (ج) المحايد الضربي. (د) المعكوس الضربي.
 - المقدار : ۲۲ + ه ۲ ب من الدرجة
- (١) الأولى. (ب) الثانية. (ج) الثالثة. (د) الصفرية.
 - الوسيط للقيم: ٤،٧،٢،٩،٣هو
 - (ن) ۲ (خ) ۲ (خ) ۲ (۱) ه

- - (۱) ۲ س (ب) ۲ س (ج) ۲ س
 - 🕥 أصغر عدد طبيعي أولى هو
 - (۱) ۱ (۱)
 - 🚺 أكمل ما يأتي لتحصل على عبارة صحيحة:
 - الشرط اللازم ليكون : $\frac{0}{-v-v}$ عددًا نسبيًا هو $-v \neq \cdots$
- ﴿ إِذَا كَانَ المنوال القيم : ٧ ، ٥ ، ٩ + ٤ ، ٥ ، ٧ هو ٥ فإن : ٩ =
 - 🖤 ۷ س تزید عن ۱۰ س بمقدار
 - (بنفس التسلسل) ٨٠٥، ٣٠١، ١٠١٤
 - (الرسط الحسابي لمجموعة من القيم يساوي على عددها،
 - $\frac{\gamma}{\pi}$ ، $\frac{\gamma}{0}$: أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين أوجد ثلاثة أعداد نسبية أعداد أعداد نسبية أعداد أعداد
- (ب) اختصر : (۲ ۲ ۳) (۲ ۴ + ۳) + ۷ ثم أوجد القيمة العددية للناتج : عندما 1 = -1
 - $\frac{r}{V} 7 \times \frac{r}{V} + 7 \times \frac{r}{V}$ استخدم خاصية التوزيع في إيجاد قيمة : $\frac{r}{V} 7 \times \frac{r}{V} + 7 \times \frac{r}{V}$
- (-) أوجد قيمة (-) التي تجعل المقدار (-) (-) ب (-) أوجد قيمة (-)
 - (1) أوجد ناتج جمع المقدارين: ٥ $\omega + \gamma = -1$ ، $\gamma \omega = \gamma$
- (ب) إذا كان الوسط الحسابى لدرجات طالب في أول خمسة شهور هو ٢٣,٨ فما هى درجة الطالب في الشهر السادس إذا كان المتوسط الحسابي لدرجاته هو ٢٨ درجة ؟

إدارة إيتاى البارود



محافظة البحيرة

أجب عن الأسئلة الأثية :

- 🐧 أكمل ما يأتي :
- $\cdots = \left| \frac{\xi 1}{V} \right| + \left| \frac{T}{V} \right|$


V (2)

(ت) ۳



إدارة أيشواي محافظة الفيوم مدرسة أبشواي بنين

Y. (1)



﴿ إِذَا كَانَتَ تَرْتِيبُ الْوسِيطُ لَجِمُوعَةً مِنَ القيمِ هِوَ الثَّالَّ فَإِنْ عَدْدُ هَذَهُ القيم = إستسسس

آ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(١) الحد الجبرى: ٣ -س ص من الدرجة

(ب) الثالثة. (1) الثانية. (ج) الرابعة. (د) الخامسة.

 $\gamma = \frac{1}{5} - \cdot, \forall \circ (7)$

(ب) ٥٠ (a) or

🍞 المعكوس الضربي للعدد : 🦞 ٢ هو

 $\frac{7}{9}\left(\frac{1}{2}\right)$ ~ 1 ~ (2)

الوسط الحسابي للقيم: ١٩، ٣٢، ٢٧، ٢٠، ٦، ٦ هو.

۹۰ (۱) (ج) ۱۸ 9(1)

باقی طرح (-۲۹) من (۲۹) =

f(=) fo-(-) fo(1) 1-(4)-

$\frac{\gamma}{\delta}$ (أ) أوجد ثلاثة أعداد نسبية بين : $\frac{\gamma}{\gamma}$ ، $\frac{\gamma}{\gamma}$

$$(-1)$$
 اختصر لأبسط صورة : $(-1)^{-1}$ – -1

 $rac{r}{V} - 7 imes rac{r}{V} + 9 imes rac{r}{V}$: استخدم خاصية التوزيع في إيجاد قيمة المتراك المتخدم أ

(ب) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ٣٥ - ٣٠ - ٢٥ - و - س

[0] (أ) أوجد حاصل جمع المقادير:

2+ PT - TPT , T+ TP 0 - PE , 1+ PT + TPT.

(ب) إذا كان الوسط الحسابي لسنة قيم هو ١٢ فأوجد مجموع هذه القيم.

أحب عن الأسئلة الأتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

0-(1)

رب) ه.

(ج) ۷

(۲) الحد الجبرى: ٣ -س ص من الدرجة

(ب) الثالثة. (ز) الثانية.

(ج) الرابعة،

(د) الخامسة.

فإن : س = (٣) إذا كان: - ، - ، + ١ عددين أوليين

(ج)

(پ) ٤) الوسيط للقيم ٣ ، ٥ ، ١ ، ٤ ، ٩ هو

(۱) ه. (۱) ۳

(ج)

(4)

 إذا كان المنوال للقيم: ٣، ٥، -٠٠ + ١، ٢ هو.٥ (د) ع **r**(1) (ب) ٥

(خ) ۲

🙀 أكمل مما يأتي :

(١) صفر

/ $= \cdot, 7 + \frac{7}{2}$

٣ حس + ١٥ حس ص = ٣ حق (..... + +

(۳) باقی طرح - ۳ - س من ۷ - س یساوی

(٤) الوسط الحسابي للقيم: ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ هو

ه إذا كانت: $\frac{7}{6}$ - 0 = 1 فإن: - 0 = 1

 $rac{\circ}{\Lambda}$ ، $rac{1}{\Lambda}$) أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين : $rac{\circ}{\Lambda}$

(ب) اجمع: ٣-٠٠ - ٢ ص + ٥ ، ٢ - ٠٠ + ص - ٣



- $\frac{\circ}{1}$ + ۲۳ \times $\frac{\circ}{1}$ + $\frac{\circ}{1}$ (ب) اختصر لأبسط صورة : (۲ ۲ – ۳) (۲ ۲ + ۳) + ۷ ثم أوجد القيمة العددية للناتج: عندما ٢ = -١
- (ب) إذا كان المنوال القيم: ٧ ، ٨ ، ٥ ، ٧ ، ص ، ٨ هو ٧ فأوجد: قيمة س



إدارة سمسطا توجيه الرياضيات

🚺 محافظة بنى سويف

أجب عن الأسئلة الأتية :

🔝 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- () درجة المقدار الجبرى: ٢ ٠٠ ٥ ٠٠ + ١ هي
- (١) الأولى.
 (ب) الثانية.
 (ج) الثالثة. (د) الخامسة.
 - المعكوس الضربي للعدد : $\left|-\frac{y}{V}\right|$ هو
 - $\frac{r}{V}(\Rightarrow)$ $\frac{V}{r}-(\psi)$ $\frac{V}{r}(\dagger)$ $\left|\frac{\nabla}{\nabla}\right| - (2)$
 - ٣ باقى طرح ه س من ٣ س هو
- (۱) ۲ س (ب) ۲ س (ج) ۸ س (د) - ۸ س
- إذا كان الوسط الحسابي للقيم: ٥، ٥، ٥، ٩، ٩ هو ٦ قإن: م =
- $(\varphi) \circ \qquad (\varphi) F \mapsto (\varphi) F \mapsto (\varphi) V_{\alpha}(\varphi)$ (۱) ۳
- 0عدد نسبی إذا کان: $-\omega \neq \dots$ عدد نسبی إذا کان $-\omega \neq \dots$

📆 أكمل ما بأتي :

- $1 = \cdots \times \frac{1}{\lambda}$
- 😙 المنوال للقيم : ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٢ هو
- $(-0.0+1)^{2} = -0.0+1$ فإن : $(-0.0+1)^{2} = -0.00$

- ﴿ إِذَا كَانَ طُولَ صَلِعَ مَكْعِبِ هُو ٢ نَ فَإِنْ حِجْمُهُ =و مَنْ عَالَمُ مَا عَالَمُ مَا عَالَمُ مَ
- () إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الرابع فإن عدد هذه القيم =
 - ر أ) اختصر لأبسط صورة : $\left(\frac{7}{7} + \frac{7}{6}\right) = \frac{3}{6}$
 - (ب) اجمع المقدارين الآتيين: ٧ ٠ م ٣ ع ، ٧ ع ٣ ص ٤ س

👔 (أ) أوجد خارج قسمة :

٢٠ س ص على و س م ١٠ س ص على و س ص ٢٠ (حيث: س ص ≠ صفر)

- (ب) باستخدام خاصية التوزيع أوجد ناتج : $\frac{V}{19} \times V + \frac{V}{19} \times V \times \Lambda \times V$
 - (أ) اختصر لأبسط صورة : (٣ -٠٠ + ٢) (٣ -٠٠ ٢) ٩ -٠٠٠
- (ب) إذا كان الوسيط القيم: ١-١، ١ + ٢، ١ ٢، ١ + ٤ هو ٢



محافظة أسيوط

إدارة أسيوط مدرسة الخياط بنات

إذا كان الوسم الصالي للقيم · ٥ ، م ، ٧ ، ٩ فو ٦ قان : م = و اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- € العدد : ﴿ ﴾ عبد نسبى إذا كان جي الجنبيلة الماليسيسة عند المالة الماليسيسة عند المالة ا
- $(1) \int_{\mathbb{R}^{N}} dz = \int_{\mathbb{R$
- - (1) الثانية. (ب) الثالثة. (ج) الرابعة. (د) الخامسة.
- رم الوسيط للقيم: ٨ ، ٤ ، ٣ ، ٥ ، ٧ هو في من من المراجعة التابعة التاب

- ﴿ المنوال القيم : ٥ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٥ ، ٣ هو
- - و) باقی طرح ۲۹ س من ۲۹ س مو

📆 أكمل ما يأتي :

- المعكوس الجمعى للعدد : $\left|-\frac{\circ}{\mathsf{Y}}\right|$ هو
- (٤) الوسط الحسابي للأعداد: ١، ٤، ٥، ٦ هو
- - (7-4-7)(7-4-7)(7-4-7) = (7-4-7)(7-4-7)
 - $\frac{r}{17} 7 imes \frac{r}{17} + 7 imes \frac{r}{17} imes \sqrt{r} + 7 imes \frac{r}{17} imes \sqrt{r}$ (ب) استخدم خاصیة التوزیع لإیجاد قیمة :
 - $\frac{7}{7}$ ، $\frac{7}{6}$) اکتب ثلاثة أعداد نسبية تقع بين العددين : $\frac{7}{6}$
- (ب) أوجد خارج قسمة: ٢٠ ٢٠ س + ١٥ ٢٠ س ١٥ ص على ١٥ ص (حيث ٢٠ ل ·)
- (ب) إذا كان ترتيب الوسيط لجموعة قيم مرتبة هو الرابع والخامس فأوجد عدد هذه القيم.



إدارة سوهاج توجيه الرياضيات

7(2)

محافظة سوهاج

أجب عن الأسئلة الآتية :

- اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
- () الحد الجبرى : -٩ -٠٠ ص من الدرجة
- (١) الرابعة. (ب) الثالثة. (ج) الثانية. (د) الأولى.

- - - العدد $\dot{\gamma}$, على صبورة $\frac{1}{2}$ =
 - $\frac{1}{1}$ (a) $\frac{1}{r}$ (a) $\frac{1}{r}$ (b) $\frac{1}{r}$ (c)
 - / ············· = \frac{1}{7} (2)
 - (۱) ۲۰ (ج) ۲۰ (ب) ۱۰ (۱)
 - = | ٤- | | ٤ | @
 - (۱) مى**ق**ر (ب) ۸ (ج) ٤

أكمل ما يأتي :

- 🕥 العدد النسبي الذي ليس له معكوس ضربي هو
- 🕎 المنوال للقيم: ٣ ، ١ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ هو
- العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين العددين : $\frac{\pi}{7}$ ، $\frac{9}{7}$ هو
 - (٤) الوسط الحسابي للقيم: ٤، ٥، ٦ هو
 - ٥ ٠٠٠ + ٤ ٥ ٠٠٠
 - $\Upsilon \omega 0$ (أ) اجمع المقدارين الآتيين : $\Upsilon \omega 0$ هن + $\Upsilon \omega + 0$ هن Υ
 - - اً) أوجد عددين نسبيين يقعان بين: ﴿ أَ ﴾ أوجد عددين نسبيين يقعان بين: ﴿
- (\cdot) أوجد خارج قسمة : ٥ $0^{"}$ + ١٠ $0^{"}$ ١٥ 0 على ٥ 0 (حيث -0 +)
 - (أ) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ١٢ س٢ ٩ س
 - (ب) إذا كان المنوال للقيم: ٢ + ٧ ، ٢ + ٣ ، ١ + ١ ، ١ + ٥ + ٥ يساوى ١٠

فأوجد: قيمة ٢





إدارة قنا

محافظة قنا

أجب عن الأسئلة الآتية : ﴿ (يسـمِح باسـتخدام الآلة الحاسـبة)

ا أكمل ما يأتي بالإجابة الصحيحة:

- 🤭 إذا كان ترتيب الوسيط لعدد من القيم هو الخامس فإن عدد هذه القيم
 -= | Y | | o- | (£)
 - 0 إذا كان: $\frac{\rho}{\sqrt{\gamma}} = \frac{\rho}{\gamma}$ فإن: $\frac{\rho}{\gamma} = \frac{\rho}{\gamma}$

🧱 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ﴿ إِذَا كَانَ الوسط الحسابي لدرجات خمسة تلاميذ هو ٣٠ فإن مجموع درجاتهم هو
 - ١٥٠ (١) ٢٥ (١)
- الخاصية المستخدمة في إجراء العملية : $\frac{7}{V} \times 1 = \frac{7}{V}$ هي خاصية
 - (١) الامج. (ب) الإبدال.
 - (ج) المحايد الضربي (د) المعكوس الضربي.
 - العامل المشترك الأعلى للمقدار الجبرى : $\pi \tau'$ ص τ ص هو
- (۱) ۲-س ص (۲ (ج) ۳-س ص (۲ (۱)
 - ② ا۲ ا..... صفر
 - $|\varphi_{n,k}| \ge (\varphi_n) \quad \forall k = 0 \text{ (a)} \quad \forall k = 0 \text{ (b)}$
 - المنوال للقيم: ٤، ٥،٤، ٣، ٧، ٥، ٤ هو
 - V(1) (1)

(١) اطرح: ٢٩٣ - ٢٩ ب- ٢ ب من ٢٠ - ١٥ و + ٤ ب

- (ب) اجمع: ٢ س ه ع + ص ، ٧ س + ٤ ص ٢ ع
 - (ج) أوجد حاصل ضرب: ٢ ٢ س (٢ ب + ٥ س)
 - $\frac{7}{\pi}$ ، $\frac{8}{6}$ ، اکتب ثلاثة أعداد نسبية تقع بين العددين : $\frac{3}{6}$ ، $\frac{7}{\pi}$
 - (ب) احسب ناتج كلًّا مما يأتى :
- $(\circ - \circ) (\circ - \circ) (\circ - \circ) (\circ - \circ)$
 - [أ) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى للمقدار الجبرى الآتى :

٩ م ان - ٦ م ن + ١٢ م ن

(ب) إذا كان الوسيط للقيم: ١ + ٥ ، ١ + ١ ، ١ + ٤ هو ١٢ فأوجد: قيمة ١



£V

إدارة إسنا توجيه الرياضيات

محافظة الأقصر

أجب عن الأسئلة الأتية :

أكمل ما يأتي :

- العدد النسبى: $\frac{7-7}{7+1}$ = صفر عندما س =
 - - أصغر عدد أولى هو
- (٤) المنوال للقيم: ٤ ، ه ، ٧ ، ه ، ٣ ، ه ، ٢ هو
- المعكوس الضربي للعدد : ٢٠ ٩ هو
 - اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :
 - (١) الحد الجبرى: ٤ ٢٩ ٢ من الدرجة
- (۱) صفر (۱) مفر (۱) م



			544		. سن	- 11	11	
: ـِنَ	ا كانت	ا اڏ	ساك	ىكون	 :	النسبج	العدد	(·∀`)
		*	*		Υ	<u> </u>		$\overline{}$

$$(a,b) \leq \operatorname{out}(b,b) = \operatorname{out}(b,b)$$

7
 وجد خارج قسمة : ۱۲ س 3 – 7 – 7 + 7 – 7 على 7 على 7

(حيث: س ≠ صفر)

$$\frac{1}{V}$$
 ، $\frac{1}{V}$: نبیة تقع بین اوجد ثلاثة أعداد نسبیة تقع بین

(ب) الجدول الآتي يبين توزيع درجات ٣٠ تلميدًا في أحد الاختبارات:

المجموع	۱۷	١٥	17.	٩	٦	الدرجة
٣.	٦	٥	. ^	٧	٤	عدد التلاميذ

أوجد الدرجة المنوالية.



امتحانات بعض مدارس المحافظات فى الجبر والإحصاء

	E
1	ETRIE!
-	

إدارة المطرية مدرسة جابر الأنصارى الحديثة الخاصة (

🦠 محافظة القاهرة

أجب عن الأسئلة الآتية :

🚺 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 الحد الجبرى: ٥ ألم من الدرجة
- (i) الثانية. (ب) الثالثة. (ج) الخامسة. (د) الرابعة.
 - آ باقی طرح -ه -س من ۳ -س هو
- (۱) میں (ب) ۲-س (ب) میں (ب) میں (ب) میں است (ب) میں (
 - آ الحد الأوسط في مفكوك (س + ۳) هو
- (۱) ۳ ش (ب) ۲ س (ج) هِ س (۱) ۲ س (۱)
- - ١٠ (ع) ٢٥ (غ) ٢٥ (ع) ٢٥ (١)
 - المعكوس الضربي للعدد ^۲ هو
 - $\frac{\gamma}{q}(z) \qquad \qquad \cdot, \xi \ (\Rightarrow) \qquad \qquad 7, o \ (\psi). \qquad \qquad \frac{\gamma-}{o} \ (1)$
 - ٦ المنوال للقيم: ٥، ٣، ٣، ٥، ٧، ٥ هـ
 - (د) ۲ (ج) ۲ (ب) ۷ (۱) ۲ (۲)

آ أكمل ما يأتي :

- آ إذا كانت : $-\omega + \frac{0}{V} =$ صفر فإن : $-\omega =$
- ٣ العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين ٢٠٠٠ م ع هو
 - = | V- | + V- (£)
 - ٥ الوسيط للقيم: ٥ ، ٣ ، ١١ ، ٨ ، ١٠ هـو

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- الله الجبرى: ٦ ص من الدرجة
- (۱) الثالثة، (ب) الرابعة، (ج) الخامسة، (د) السادسة،
 - آ العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين 🐈 ، 🥱 هو
 - $\frac{\dot{\phi}}{\nabla V} (1) \qquad \frac{\xi}{q} (\frac{1}{2}) \qquad \frac{\gamma}{\xi} (1)$
 - المعكوس الضربى للعند $\left(rac{1}{2}
 ight)^{lpha ext{init}}$ هو
 - 1-(1) 1(3) Y-(4)
 - نَا إِذَا كَانَ : $\frac{\delta}{m+7}$ عددًا نسبيًا فإن : $m \neq m$
 - (د) ه (ح) ۲ (ع) معفر
 - ه الوسيط للقيم: ٥ ، ٤ ، ٧ هو
 - - إذا كان الوسط الحسابي القيم: ٣ ، ٥ ، -س + ٢ هو ٤
 - فإن الوسط الحسابي للقيمتين: ٥ -س ، ٥ + ٢ -س هو
 - (۱) ۲ (ج) ۲ (ج) ۲ (۲)
 - $\frac{r}{V}$ $7 \times \frac{r}{V}$ + $7 \times \frac{r}{V}$: استخدام خاصیة التوزیع أوجد قیمة و آ
 - $\frac{1}{Y}$ ، $\frac{1}{Y}$: أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين العددين

ك (أ) ما زيادة: ٧ -س + ه ص + ع عن ٢ -س + ٦ ص + ع؟

- (بِ) أوجِد خارج قسمة : ١٤ س ص ٣٥ ٣٥ س ص + ٧ س ص على ٧ س ص
 - حیث س ≠ صفر ، ص ب≠ صفر

• (أ) اختصر لأبسط صورة : (-س - ٣) (-س + ٣) + ٩

ثم أوجد قيمة الناتج عندما: -س = ه

- (ب) إذا كان الوسط الحسابي للقيم: ٨ ، ٧ ، ٥ ، ٩ ، ٤ ، ٣ ، ك + ٤ هو ٦
 - فأوجد: قدمة ك

0(1)

9(2)

Y. (2)

· V (\(\du)\)

- $\frac{\xi}{4}$ Y × $\frac{\xi}{4}$ + A × $\frac{\xi}{8}$: آن استخدم خاصیة التوزیع فی إیجاد قیمة : $\frac{\xi}{8}$ × A + $\frac{\xi}{4}$ × Y $\frac{\xi}{4}$
 - $\left(\begin{array}{c} \frac{7}{5} \end{array} \right)$ أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين : $\frac{7}{5}$ ، $\frac{7}{5}$
- ٤ (١) اجمع المقدارين: ٥ س + ٢ ص + ١ ، ٢ س ٢ ص + ٥
- - (أ) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ٤ -س ص ٦ -س ص + ٢ -س ص

**************************************	أبريل	مارس	فبراير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	الخهروء
beddissendandada,	۲۸	77	· 72	۲۷	77	77	الدرجة

أوجد: ١٦ الوسط الحسابي للدرجات.

إدارة المعادي توجيه الرياضيات





17- (2)



أحب عن الأسئلة الأتية :

١ أكمل ما بأتي :

- المعكوس الجمعي للعدد $-\frac{6}{3}$ هو المعكوس
- ۲ کا س^۳ ÷ (-٤ س^۲) = ، س ≠ صفر
- \mathbb{T} إذا كان: $\frac{V}{V} \times -\omega = 1$ فإن: $-\omega = 0$
- 🚼 الوسيط للقيم : ١٠ ، ٨ ، ٧ ، ٩ ، ٥ هو

آ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- -----= | V- | + | 0 | T
 - 17 (1)
- (ب) ۲ (ج) ۲-۲
- - آ باقبي طرح ٥ س من ٧ س هو
- (۱) -۲ س (ج) ۱۲ س (ج) ۱۲ س V (1)

- (\cdot) أوجد خارج قسمة المقدار: ۱۲ س 7 ۹ س 7 + 7 س على 7 س (حيث $^ ^-$

 - (ب) الجدول الآتي يوضح درجات أحد التلاميذ في مادة الرياضيات خلال العام الدراسي:

***************************************	أبريل	مارس	فبراير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	(2.24)
	۲۸	77	· 72	۲۷	77	77	الدرجة

٢ الوسيط للدرجات.

محافظة القاهرة



$rac{r}{V}$ + Y $imes rac{r}{V}$ + E $imes rac{r}{V}$: استخدم خاصية التوزيع في إيجاد ناتج :

 $rac{1}{\sqrt{2}}$ ، $rac{\circ}{1}$: بين يقعان بين يو ، $rac{1}{\sqrt{2}}$

فإن : س =

(+) أوجد خارج قسمة : ٢٥ -0^7 + ٥ -0^7 - ١٥ -0 على ٥ -0 ، $-0 \neq 0$

(ب) ۱۰ (ج) ه

(ب) ۳ (ج) ٤

(-) (د) صفر (-1)

(چ) ۳

و أ) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ١٢ ٢ ٢ + ١٨ ٢ ٢ - ٦ ٩

T درجة الحد الجبرى: ٧ - س ص هي

٤ إذا كان : رم عددًا نسبيًا فإن : م ≠

إذا كان المنوال للقيم: -س+٣، ٦، ٩، ١٠، ٦، ١٠ هو ٦

(ب) ۲

ان کان: $\frac{7}{2}$ س = ها فان: $\frac{7}{2}$ س =

(i) أوجد ناتج جمع: ٣ -س - ٦ ص + ه ع ، ٢ -س - ٣ ع + ٣ ص

Y(1)

1.(1)

(ب) إذا كان الوسط الحسابي للقيم : ٢ ك ، ٣ ك ، ١٠ ، ٤ هو ٦ فأوجد : قيمة ك

محافظة القاهرة

إدارة الساحل محرسة أم المؤمنين بنات

أجب عن الأسئلة الأتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- إذا كان ترتيب الوسيط لجموعة من القيم هو الرابع فإن عدد هذه القيم هو
 - (۱) ٤ (ب) (چ)، ه .
 - آ إذا كان: حداً نسبيًا فإن: خ السسسان المان عن المان عن المان عن المان المان عن المان المان
 - (چ) ۲ (ب) ۲۲ **r**-(i)

محافظة الحيزة



 $\frac{1}{4}(7)$

أجب عن الأسئلة الأتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- - $\mathbf{q} \; (\mathbf{p}) \qquad \qquad \frac{\mathbf{q}}{\mathbf{q}} \; (\mathbf{1})$ · • (÷)
 - المعكوس الجمعى للعدد | -٤ | هو
- (ب) –٤ ٤(١) $\frac{1}{5}$ (\Rightarrow) (L) ± 3
 - انا کان العدد النسبی $\frac{-\upsilon + \tau}{\tau} =$ صفر فإن : $-\upsilon =$
- ۲ (۱) ۲۰ (۲۰) (ج) ٦٦ Y (2)
 - ٤ الحد الجبرى: ٤ -س ص من الدرجة ٤
- الرابعة: (ج) الثالثة. (ب) الثانية. (د) السادسة.
 -= / 7. 10
 - ٧٠ (ټ) ۲٩– (١) //. V · (÷) 1 79 (3)
 - آإذا كان: $\frac{3}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{7}}$ فإن: $-\omega = \dots$
 - (ب) ٤ £9 (1) (ج) ۷ Y'(2)

آ أكمل ما يأتي :

- الحد الجبرى: ٧ -س يزيد عن -٣ -س بمقدار
- ٣] إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الرابع فإن عدد القيم يساوى
 - - (-- ∘) (-- ∘) (-- ∘) (-- ∘)
 - ۱ س س + ۲ ص ۲ ، ۲ س ص ۱ آ
 - (ب) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: س ص + س ص ا

- آ الحد الجبرى: ٢ -س ص من الدرجة
- (د) السادسة. (ت) الثالثة. ﴿ دِي الخامسة. (١) الثانية.
- إذا كان المتوال للقيم: ٧ ، ٥ ، ٧ ، -- + ٤ ، ٥ ، هو ٥
 - (د) ٤ (ج) ۷ (پ) ٥ 1(1)
 - ه المعكوس الضريي للعدد ٢٠ هو
 - $\frac{r}{r}$ (\Rightarrow) $\frac{r}{r}$ (ψ) $\frac{r}{r}$ (1) 1(2)
 - $\therefore \dots = \frac{\lambda}{I}$
 - Vo (2) ۲۰ (ب) ۲۰ (۱) (ج) ٥٠

ك أكمل ما يأتي :

- المعكوس الجمعى للعدد $\left(\frac{1}{\sqrt{1-1}}\right)^{\text{out}}$ هو
 - آ باقی طرح ۳ س من س هو
- $\overline{\Upsilon}$ إذا كان: $\frac{7}{1} = \frac{7}{2}$ فإن: $\frac{7}{1} = \frac{7}{2}$
- ٤] إذا كان الوسط الحسابي لدرجات ٥ تلاميذ هو ٣٠ فإن مجموع درجاتهم يساوي
 - ه العدد النسبي الذي ليس له معكوس ضربي هو
 - (أ) أوجد عددين بين: $\frac{1}{7}$ ، $\frac{3}{7}$ أحدهما نسبى والآخر صحيح.
 - (-) استخدم خاصیة التوزیع فی إیجاد قیمة : $\frac{7}{V} \times Y + \frac{7}{V} \times I \frac{7}{V}$

٤ (١) ١ أوجد خارج قسمة:

ه -س" + ۱۰ -س" - ۱۰ -س علی ه -س (حیث -س ≠ صفر)

- آ حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ٣ -س (٢ + س) + ٧ (٢ + س)
 - (ب) اجمع: س ۲ + ۷ س + ۱ ، · -ه س ۲ + ۳ س ۱

(1) (1) اختصر: $(-\omega + \gamma)$ ($(-\omega + \gamma)$) ($(-\omega + \gamma)$)

(ب) إذا كان مجموع درجات يوسف في ٣ شهور متتالية في مادة الرياضيات هو ٢٧٦ فما هي درجة يوسف في الشهر الرابع إذا كان المتوسط الحسابي لدرجاته هو ٩٣,٥ درجة ؟

- $\frac{V}{V}$ ۱٤ × $\frac{V}{V}$ + ٤ × $\frac{V}{V}$: أ) باستخدام خاصية التوزيع أوجد قيمة : $\frac{V}{V}$ + ٤ × $\frac{V}{V}$ + ٤ × $\frac{V}{V}$
 - (ب) اقسم: ۲ س + س^۲ ۸ علی س ۲ حیث س ≠ ۲
 - (أ) اختصر : (۲ -س + ۱) (-س + ۲) ۲ -س۲

 $\frac{r}{c} = \omega - 1$ ثم أوجد القيمة العددية للناتج عندما

(ب) الجدول التالي يوضح درجات ٣٠ تلميذًا في أحد الاختبارات:

۱۹	١٦	١٤	14	١.	क्शिया (*
٤	٦	١.	٣	٧	Jun (A) Osc

والمطلوب إيجاد الدرجة المنوالية.



إدارة ٦ أكتوبر مدارس أم المؤمنين الخاصة

محافظة الجيزة



أجب عن الأسئلة الاتية :

أكمل ما يأتي :

- ا إذا كان: $\frac{\gamma}{\gamma} \times -\omega = 1$ فإن: $-\omega = 0$
 - المقدار : ۲ ۲ + ه ۲ من الدرجة
- ۳ العدد النسبى الذى ليس له معكوس ضربى هو
- ع إذا كان : ه ٢ = ه ، ب٢ = ١ فإن : ب =
- إذا كان المتوسط الحسابي للقيم: ٢٧ ، ٨ ، ١٦ ، ٢٤ ، ك هو ١٤
 فإن: ك =

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- المعكوس الجمعى للعدد $\left(-\frac{\pi}{2}\right)^{\text{out}}$ يساوى
- $\frac{\xi}{\Upsilon} (\omega) \qquad \frac{\Upsilon}{\xi} \qquad (-1) \qquad (-1)$

- آ إذا كان المنوال للقيم: ه، ٦، ال ٢ هو ٦ فإن: ف =
 - $(i) \circ (i)$
 - $\frac{\gamma}{\sigma}$ يزيد عن $\left(\frac{\gamma}{\sigma}\right)$ بمقدار
 - (1) (2) $\frac{\xi}{\alpha} = (2)$ (3) (4) (4) (5) (5)
 - العدد النسبى $\frac{\gamma + \gamma}{1 + \gamma} =$ صفر عندما $\frac{\gamma}{1 + \gamma} = \dots$
 - V-(1) V-(1) V-(1)
- اذا کان: (س + ه) (س − ه) = س + ك فإن: ك =
- (۱) ه (د) صفر (۱۰ (ح) معفر
 - 🚺 (أ) استخدم خاصية التوزيع في إيجاد قيمة ما يلي :

 $\frac{7}{7} - \frac{7}{4} \times \frac{7}{4} + \frac{5}{4} \times \frac{7}{4}$

(-) اختصر لأبسط صورة ما يلى : (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ثم أوجد قيمة المقدار عندما : - (-)

٢ - ١٠ اجمع المقدارين: ٢ -س - ٢ ص + ٥ ، -س + ٢ ص - ٢

ثم اطرح الناتج من: ٧ ص + ٥ س - ٢

- (ب) إذا كان الوسيط للقيم: ١+٥ ، ١+١ ، ١+٤ هو ١٢ فأوجد: قيمة ١
 - و (أ) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى للمقدار الجبرى الآتى :

٩ م ن ٢ - ٦ م ن ٢ + ١٢ م ن

(ب) إذا كان المقدار : ٢ س + V + ١٣ س + U يقبل القسمة على س + U حيث (س \neq U أوجد : قيمة ك





V(2)

ادارة برج العرب توجيه الرياضيات

محافظة الاسكندرية

أجب عن الأسئلة الأتية :

الكمل ما يلي:

- آ الحد الجبرى: (-٣ -س^٣ ص) من الدرجة
- آ الوسط الحسابي للقيم: ٤، ٥، ٧، ٨، ٦ هو
 - Υ اندا کان: $\frac{1}{1} = \frac{1}{2}$ فإن: $\frac{7}{1} = \cdots$
 - الشرط اللازم لجعل ٥ عددًا نسبيًا هو
 - $\cdots = \frac{\xi}{4} \div \frac{\lambda}{r} \quad \boxed{0}$
- ن : ۳ س × $\omega = 1$ سن الله عان : $\omega = -1$ سن الله عان : $\omega = -1$

آخر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- = | 0 | | V- | \(\)
- 17(a) Y-(a) Y(i)
- 🔧 🧻 المتوال للقيم : ١ ، ٣ ، ٧ ، ٣ ، ٧ ، ٣ هو
- (پ) ۳ 1(1) (د) ۷ (ج) ٣
 - 🏋 الوسيط للقيم : ٤ ، ٨ ، ٣ ، ٥ ، ٧ هو
 - (ب) ٤ (ب) ٢ (١) .
- ه العامل المشترك الأعلى للمقدار الجبرى : $\gamma 0$ ~ -7 \sim هو
- ۲-س ص (ب) ۳-س ص (ج) بين ص ۳-۲ (۱)
 - au imes au (1) باستخدام خاصية التوزيع أوجد ناتج :
 - (ب) أوجد عددين نسبين بين: 🚽 🗸 🔻




(i) اطرح: ٥ س ۲ + ص ۲ – ۳ س ص من س ۲ – ۲ س ص + ۳ ص ۲

- - (۱) أوجد خارج قسمة : (۲۷ س 2 ۲ س 7 + ۳ س 7) ÷ ۳ س 7 ، (س \neq صفر)
 - (ب) الجدول الآتي يوضح ساعات المذاكرة لأحد الطلاب خلال ٦ أيام:

الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	الأحد	السبت	- 科里基础
۲	٣	٤	۲,٥	٣	٣,٥	हेडीमा डोइडिडिंड

احسب متوسط عدد ساعات المذاكرة يوميًا.

محافظة القليوبية



أحب عن الأسئلة الأثبة :

- اختر الإجابة الصحيحة من بن الإجابات المعطاة:
- المعكوس الضريى للعدد $\left(\frac{1}{2}\right)^{\text{out}}$ هو
- Y-(~) Y(i) (ج) ۱ 1-(2)
 - إذا كان العدد $\frac{0}{1+1}$ عددًا نسبيًا فإن : $-\infty \neq \dots$
- (i) **صف**ر (ب) ۲ (ج) ۲۰ (د)ه
 - \overline{T} العدد النسبى الذى يساوى $\frac{7}{2}$ ومجموع حديه ۲۱ هو
- $\frac{1}{\sqrt{r}} (\Rightarrow) \qquad \frac{1}{\sqrt{r}} (\Rightarrow) \qquad \frac{1}{\sqrt{r}} (\Rightarrow)$ V (2)
 - اِذَا كَانَ: $\frac{|-o|}{|-o|} = 1$ فإن: -o = 0
- (ب) ه (ج) ۱ (ج) 1-(2)
 - $\overline{}$ اذا کان : $1 \times \frac{\overline{}}{\overline{}} = \frac{\overline{}}{\overline{}}$ فإن : $\overline{} = \dots$
- 9(=) 7(-) 1(i) 1(2)
- إذا كان المنوال للقيم: ٧ ، ٥ ، -س + ١ ، ٥ ، ٧ هو ٥ فان : -س = سيسسس
 - (ب) ٤ (ج) ه 1(1) V(2)

آ أكمل ما بأتي:

- - اً إذا كان: $\frac{7}{\sqrt{}}$ س = ٤٢ فإن: $\frac{6}{\sqrt{}}$ س =
 - $\frac{-7}{2}$ خارج قسمة $\frac{-7}{1}$ على $\frac{-7}{2}$ يساوى
 - كَ الحد الجبري (-٤٥) من الدرجة
 - @ زيادة: ه س من ٤ س من عص مي

$\frac{\gamma}{6}$ ، $\frac{\gamma}{6}$ ، وجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين $\frac{\gamma}{6}$ ، $\frac{\gamma}{6}$

آ باستخدام خاصية التوزيع أوجد ناتج:

$$\frac{\sqrt{r}}{r!} \times \frac{l!}{\sqrt{l}} + \frac{\sqrt{r}}{r!} \times \frac{l!}{\sqrt{l}} - \frac{\sqrt{r}}{r!} \times \frac{r}{\sqrt{l}}$$

💈 (أ) أوجد خارج قسمة :

(ب) ما زيادة: ٥ -س + ٥ ص - ع

 $\Upsilon=\delta$ ، $\Delta=-1$ ، $\Delta=-1$ ثم أوجد القيمة العددية للمقدار عندما : $\Delta=-1$

و (1) أوجد عددًا نسبيًا يقع عند تلث المسافة بين العددين: ٢٠٠٠ من جهة العدد الأكبر.


(ب) الجدول الآق يوضح عدد ساعات المذاكرة لأحد التلاميذ:

الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	الأحد	السبت	اليوم
۲	٦	٥	٣	۲,٥	٤,٥	عدة ساعات المذاكرة

٢ الوسط الحسابي..

احست: ١٦ الوسيط.

محافظة الشرقية



أجب عن الأسئلة الأتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- V ____ یکون عددًا نسبیًا بشرط س ≠
- (ب) V- (ب) V(2) 0-(1)
 - 1 إذا كان : $\frac{7}{2} = \frac{7}{7}$ فإن : $\frac{77}{7} = \dots$
- $(i) \frac{o}{r} \qquad (-i) \frac{f}{o}$ · + (2)
- آ إذا كان الحد الجبرى: ٩ -س ص من الدرجة الثالثة [٣] فان : س=
 - (ب) ۲ (د) ٤ (ج) ۳ N(1)
- نا إذا كان العدد النسبى $\frac{-u-v}{v}$ له معكوس ضربى فإن : $-u \neq \dots$
 - (ب) Vm-(2) o-(i)

 - 0(1)
 - (ب) ۳ (ج) ٤ Y(1)
 - T + 3.
 - <(i) (ذ)≥ (ب) < (ج) =

🚹 أكمل كلًا مها يلي لتصبح العبارة صحيحة :

- $1 = \frac{1}{2} =$
- آ إذا كان المنوال للقيم: ٣ ، ٤ ، ص ١ ، ٣ ، ٤ هو ٤ فإن: ص =
 - $1 = \cdots \times r \frac{1}{5}$
 - تنقص عن $\frac{\xi}{\sqrt{2}}$ بمقدار
 - (----- + ۱۵ + ۲ من ص = ۳ من (----- + ۱۵ من من ا

44

40

(د_:) **صف**ر

- $\frac{\circ}{V}$ ، أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين : $\frac{1}{V}$
- (\cdot) استخدم خاصية التوزيع لتسهيل إيجاد ناتج : $\frac{7}{V} imes \frac{7}{V} imes \frac{7}{V} imes \frac{7}{V}$
 - (۱) اختصر لأبسط صورة : (س + ۳) (س ۱) (س + ۱) ثم أوجد القيمة العددية للناتج عندما : $-0 = \frac{7}{2}$
 - (بَ) ما زيادة: ٧ -س + ٥ ص + ع عن ٢ -س + ٦ ص + ع ؟
- ور () أوجد خارج قسمة: $7 0^7 + 17 0 + 7$ على 7 0 + 7 حيث $-0 \neq \frac{-7}{2}$
- (ب) الجدول الآتي يبين درجات أحد الطلاب في اختيارات الشهور الدراسية لمادة الرياضيات والمطلوب إيجاد الوسيط لهذه الدرجات:

أبريل	مارس	فبراير	ديسمبر	توقمبر	أكتوير	33544 ³ 1
٤٨	٤٤	٣٥	٥٠	٤ -	٣.	الدرجة



إحارة أشمون

محافظة المنوفية

أجب عن الأسئلة الآثية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

ان ا کان :
$$\frac{0}{-u-v}$$
 عددًا نسبیًا فإن : $-u \neq 0$

$$\frac{7}{7} (2) \qquad \frac{7}{7} (2) \qquad \frac{5}{7} (1)$$

- o أصغر عدد طبيعي أولى هو
- 1(1) (ب) – ۱
- (ج) ۲
- آ إذا كان: 🛆 + 🗀 = ۲۰ ، ۲۰ = 🗀 = ۲۰ فان : 🛆 =
 - 10(i) ۲۰ (ب) (ج) ٥ :1.(2)

آ أكمل ما يأتي:

- المنوال للقيم: ٣،١،٢،٢،١،٢ هو
- العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين العددين : $\frac{q}{\chi}$ ، $\frac{q}{\chi}$ ، و
 - ٣ ٧ س تزيد عن ١٠ س بمقدار
 - 2 الوسط الحسابي للقيم: ٣، ٢، ٩، ٤، ٨ هو
 - - ٢ (١) اجمع: ٢ س ٥ ع + ص ، ٧ س + ٤ ص ٢ ع
- (-) أوجد قيمة ك التي تجعل المقدار -- + + - + ك يقبل القسمة على + +
 - آ حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ٣ -س ص ٦ -س
 - $rac{r}{V} rac{V}{V} imes rac{r}{V} + rac{\circ}{V} imes rac{r}{V} imes rac{r}{V} imes rac{r}{V} rac{V}{V} imes rac{r}{V} imes rac{r}{V}$ استخدم خاصية التوزيع في إيجاد قيمة :
 - $\frac{\gamma}{\gamma}$ ، $\frac{\gamma}{\delta}$: أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين العددين
 - (۱) اختصر لأبسط صورة: (س + ۲) + (س + ۲) (س ۲)
- (ب) آ إذا كان ترتيب الوسيط لجموعة قيم مرتبة هو الرابع والخامس فأوجد عدد هذه القيم.
- 1 إذا كان المنوال للقيم: 1 + V ، ۲ + ۳ ، ۱ + ۴ ، ١ + ۴ ، ٢ + ٠ ، ١ + ٥ يساوى ١٠ فأوجد: قسمة ١



إدارة زفتن توجيه الرياضيات

🦳 محافظة الغربية

أُدِبُ عِنَ النَّسِئِلَةُ الأَتَيِةُ ؛

1 أكمل ما يلي :

- (بنفس النمط والتسلسل) $\frac{7}{7}$ $\frac{7}{7}$ $\frac{7}{3}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{5}$
- العدد النسبى الذى يقع فى منتصف المسافة بين العددين ¹/₇ ، ¹/₃ هو
 - 🍸 باقی طرح 🔓 من 😽 هو
 - -----× × 17 = 17 = 17 E
 - o الوسط الحسابي للقيم: ٢، ٦، ٤، ه ، ٨ هو

أختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- /····· = \frac{r}{0} \ldots
- ۱۰۰ (ع) ۲۵ (ج) ۷۵ (ب) ۲۰ (۱)
 - آ ربع العدد ۱۲۶ يساوي
- ١١٤ (١) ٢٢ (١) ٢٢ (١) ٢٢ (١)
 - $\nabla \frac{\delta}{\tau}$ لا تمثل عددًا نسبيًا إذا كانت : τ =
 - (1) and (-1) (-1)
 - (۱) ۲ (۱) ۲ (۱) ۲ (۱) ۲ (۱) ۲ (۱)
- إذا كان المتوال للقيم: ٥ ، ٧ ، س + ١ ، ٧ ، ٥ هو ٧ فإن : س =

 - آ إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو ٧ فإن عدد القيم يساوى
 - $(i) \land (c)$
 - (1) اختصر لأبسط صورة : (-1) + -1 + -1
 - ثم أوجد القيمة العددية للناتج عندما: --- = ١

(ب) باستخدام خاصیة التوزیع أوجد قیمة ما یلی فی أبسط صورة : $\frac{\tau}{\circ} + \Lambda \times \frac{\tau}{\circ} + \frac{\tau}{\circ} \times \Lambda + \Lambda \times \frac{\tau}{\circ}$


$$7 = \frac{1}{7}$$
 ، $2 = -7$ ، $3 = -7$ فأوجد في أبسط صورة قيمة : $\frac{-0}{7}$ ، $3 = -7$

- (ب) إذا كان: ٢ س م + ١١ س + ٢ س + م يقبل القسمة على س + ٣ بدون باق فأوجد: قيمة م
 - و (أ) اجمع المقادير الآتية :

(ب) سجلت درجات أحد التلاميذ في امتحان الرياضيات لسنة شهور دراسية وكانت: ٢٠ ، ٣٥ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٤٤ ، ٥٠

أوجد الوسيط والوسط الحسابي للدرجات السابقة.

١١) 🥈 محافظة الدقهلية



أحِب عن الأسئلة الأتية . ﴿ (يسوح باستخداه الآلة الحاسبة)

- المعكوس الجمعى للعدد $\left(\frac{Y}{o}\right)^{onic}$ يساوى
- $\frac{Y-}{\circ}$ (a) $\frac{Y}{\circ}$ (b) $\frac{Y-}{\circ}$ (c)
- إذا كان المنوال للقيم: ٥ ، ٧ ، س + ٥ ، ٩ هو ٧ فإن: س =
- ۲ (١) (ج) ه (ج) ٤ (١)
 - ٣] إذا كان: ٢ عددًا سالبًا فإن العدد يكون موجيًا،
 - - العدد النسبى $\frac{-v+v}{v-v}$ يساوى الصفر عندما $\frac{v+v}{v-v}$
 - (1) صفر (1) (2) (2) (3)



١٢) محافظة الإسماعيلية



YY (2)

1.. (2)

أجب عن الأسئلة الآتية : ﴿ ريسوح باستخدام الآلة الحاسبة ﴾

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 🕥 الوسيط للقيم : ٧ ، ٧ ، ٩ هو
 - ٧ (ټ) 7(1)
- الحد الجبرى: ٨ س ص من الدرجة
- (د) الثامنة. (1) الثانية. (ب) الرابعة، (ج) السادسة.

(چ) ۹

- $\overline{\gamma}$ اذا کان: $\frac{\gamma}{\alpha} \times \overline{\gamma} = \overline{\gamma}$ فإن: $\overline{\gamma} = \cdots$
- (i) صفر (ب) ۱ (ج) ۳ 0(7)
 - % ····· = \frac{\fin}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac}}}}}}}{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\f
 - ٥٠ (ت) ٢٥ (١) (ج) ۷٥
 - آ باقع طرح ٧ -س من ٣ -س هو
- (د)-۱۰-(ع)
 - 🕥 ه کچم =جرام.
- 0 () $0 \cdot \cdot \cdot (\Rightarrow) \qquad 0 \cdot \cdot \cdot (\downarrow)$ 0.(1)

آ أكمل ما بأتي :

آ إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الخامس فإن عدد القيم يساوى

آ إذا كان: <u>^ </u>عددًا نسبيًا فإن: س ≠

٤ العدد آه, في صورة أُ يكون

ه مربع طول ضلعه ه سم یکون محیطه

- \ = \ldots \ \ldots \ \frac{1}{\sigma} \ \sigma \ \sigma \ \frac{1}{\sigma} \ \sigma \sigma \sigma \sigma \sigma \ \sigma \ \sigma \sigma
- $\frac{7}{7}(2) \qquad \frac{7}{7}(2)$ 1(1)
 - ٦ باقى طرح ٢ س من ٣٠ س يساوى
- (L) 1 W (۱) -ه س (ج) س ۲ (ب) س م- (۱)

 $\frac{Y}{Q}(z)$

أكمل العبارات الآتية ما يناسبها:

- 🚺 المعكوس الضربي للعدد ٣٠٠٠ يساوي
- آ الوسط الحسابي للقيم : 1 + 0 ، 1 + 7 ، 0 7 بساوي
- ٣ ه سن ص ١٥ س ص = ٥ س ص (............
- [2] إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الخامس فإن عدد هذه القيم
 - $\cdots \cdots \cdots \cdots = (\Upsilon + \psi + \chi) (\circ \psi) \circ$
 - مستطیل مساحته (٤ $-\omega'$ $ص + ١٢ \omega$ $ص) وطوله ٤ <math>-\omega$ ω أوجد عرضه حيث س ص ل ٠
 - (\cdot) باستخدام خاصية التوزيع أوجد ناتج : $\frac{(18)^7-7\times11+11}{12}$
- (چ) إذا كان: 1 + 7 = 0 ، $c = \frac{1}{2}$ فها قيمة: (7 + 7 c) + 1?
- $\Upsilon = -\frac{1}{2}$ (أ) اختصر لأسط صورة: $(-\omega + 1)^{2} 3$ $(-\omega + 1)$ وأوجد قيمة الناتج عندما: $-\omega = 1$
 - $\frac{7}{4}$ ، وجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين : $\frac{3}{6}$ ، $\frac{7}{4}$
 - ٥ (أ) ما نقص المقدار: ٣ -س ٥ -س عن -س + -س ٢ ؟
 - (ب) إذا كان الوسط الحسابي لأطوال أضلاع مثلث هو ٧ فأوجد محيط المتلث.
 - (ج) أوجد خارج قسمة : س ' 7 0 7 على $-0 + 1 (-0 \neq -1)$

٤١

- آ أكمل ما يأتي:
- آ إذا كان: ٥١ = ٥١ ، ١٠ = ١ فإن: ب =
 - آ باقي طرح ٢ س من ٣ س هو
 - ٣ الوسيط للأعداد : ٣ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ١ هو
 - ا ۱ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۵ ، ۸ ، (بنفس النمط)
- إذا كان المنوال للأعداد : ٧ ، ه ، ١ + ٢ ، ٢ هو ه فإن : ١ =
 - $\frac{r}{V} 7 \times \frac{r}{V} + 9 \times \frac{r}{V}$: أ.) باستخدام خاصية التوزيع أوجد قيمة
 - - $\frac{7}{6}$ ، $\frac{1}{7}$: أوجد العدد النسبى الذي يقع في منتصف المسافة بين $\frac{7}{7}$
 - (i) اختصر : (س + ص) (س ۲ + ص۲)

ثم أوجد القيمة العددية للناتج عندما: -0 = 0

- $\frac{1}{\sqrt{1}}$ ، $\frac{7}{\sqrt{10}}$: أوجد ثلاثة أعداد نسبية محصورة بين $\frac{7}{\sqrt{100}}$
- 7 حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ١٨ 7 ص 7 + 7 ص 7 ص 7 ص 7
 - - (ب) الجدول التالي يبين درجات أحد التلاميذ في الرياضيات عدة شهور:

أبريل	مارس	فبراير .	ىيسمېر	نوفمبر	أكتوبر	- 100
٤٨	٤٧	٤١	19	٤.	۲٥	Mestal.

والمطلوب حساب المتوسط الحسابي.



- $\frac{\circ}{V}$ + \circ × $\frac{\circ}{V}$ + \wedge × $\frac{\circ}{V}$: استخدم خاصية التوزيع في إيجاد ناتج $\frac{\circ}{V}$ + \wedge × $\frac{\circ}{V}$ + $\frac{\circ}{V}$ × $\frac{\circ}{V}$ × $\frac{\circ}{V}$ + $\frac{\circ}{V}$ × $\frac{\circ}{V}$ ×
 - $\frac{7}{7}$ ، $\frac{7}{8}$: نحصر بین $\frac{7}{8}$ ، $\frac{7}{7}$
 - ٤ (١) اجمع المقدارين: ٥٥ + ٢ - ١ ، ٢٠ ٢ ٤ +
- (-) أوجد خارج قسمة : ۲ $-0^7 + 7 0 + 7$ على -0 + 7 2 0 0
 - ملل بإخراج العامل المشترك الأعلى : ٦ س 7 ص ١٢ س 7
 - (ب) اختصر لأبسط صورة : (س + ۲) (س ۲) + ٤



ادارة فوه توجيه الرياضا

۱۲) محافظة كغر الشيخ

أجِب عن الأسئلة الأثية :

- 1 الحد الجبرى: ٢ -س^٢ ص من الدرجة
- (۱) الأولى. (ب) الثانية. (ج) الثالثة. (د) الرابعة.
- الوسط الحسابي للأعداد: ٥ ، س + ١ ، ٣ س هو
 - $\circ (\iota) \qquad \qquad \mathsf{Y}(\varphi) \qquad \qquad \mathsf{Y}(1)$
 - ٣ إذا كان: ٣ عددًا نسبيًا فإن: س ≠
 - $(1) \text{ out. } (+) \qquad (+$
 - ك المعكوس الضربي للعدد ٤ , ٠ في أبسط صورة هو
 - $\frac{\circ}{\Upsilon} \ (\cdot) \qquad \qquad \frac{\Upsilon}{\circ} \ (\div) \qquad \qquad \frac{\P}{\$} \ (\circ)$
- وَ إِذَا كَانَ العدد النسبي عدرًا موجبًا فإن : س صفر
- $\leq (\downarrow)$ $= (\downarrow)$ $< (\uparrow)$
 - 🗻 عملية ليست مغلقة في ن
- (د) القسمة (ب) الطرح (ج) الضرب (د) القسمة



محافظة البحيرة

إدارة مركز دمنهور مدرسة محمد عبد الرحمن قرقورة

أجب عن الأسئلة الآتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

هو	17.	بین ۸	المسافة	منتصف	في	يقع	الذي	النسبي	العدد	
----	-----	-------	---------	-------	----	-----	------	--------	-------	--

$$1 \cdot \frac{1}{7} (2)$$
 $1 \cdot (-1)$ $1 \cdot (-1)$

$$17(2) \qquad 11(4) \qquad 17(4)$$


$$(())$$
 $(())$ $(())$ $(())$

$$\Upsilon-(2)$$
 $\Upsilon(2)$ $\Upsilon(3)$

آ أكمل ما بأتي :

$$1 = \cdots \times \Upsilon \frac{1}{\xi} \Upsilon$$

المعكوس الجمعى للعدد
$$\left(\frac{1}{\sqrt{1}}\right)^{\text{out}}$$
 هو



(ل) أوجد خارج قسمة :

$$\frac{T_{-}}{T} \neq 0$$
 $\neq 0$ $\neq 0$

بر (ا) اختصر لأبسط صورة :
$$(-\omega + 7)^{7} - (-\omega - 7) (-\omega + 7) - 7 - \omega$$

محافظة الغيوم



أجب عن الأسئلة الأثنة :

العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين
$$\frac{1}{3}$$
 ، $\frac{7}{3}$ هو

$$\frac{1}{7}(1) \qquad \frac{1}{3}(2) \qquad \frac{1}{3}(1)$$

الشرط اللازم كى يكون
$$\frac{\sqrt{}}{-0}$$
 عددًا نسبيًا هو $-0 \neq \cdots$

$$V(a)$$
 $\frac{V}{o}(a)$ $o(a)$

$$(1)$$
 الثانية. $(-)$ الثالثة. $(-)$ الرابعة. $(-)$ الخامسة.

آ أكمل ما يأتي :

- آل العدد النسبي الذي ليس له معكوس ضربي هو
- آ إذا كان المنوال للقيم: ١٥ ، ٩ ، ٠٠ + ١ ، ٩ ، ٥١ هو ٩ فإن: -س =
 - كَ باقى طرح (-٥ -س) من ٣ -س هو
 - المعكوس الجمعى للعدد $\left|\frac{-6}{7}\right|$ هو
 - ۳-س-ه ص-۳ ، ۲-س-ه ص-۳) اجمع: ۲ ص + ه س-۱ ، ۲ س
 - (μ) استخدم خاصیة التوزیع لإیجاد قیمة : $\frac{7}{17} \times 7 + \frac{7}{17} \times 7 \frac{7}{17}$
 - \ = † : عند : اختصر : (۲ † + ۲) (۲ † + ۳) + ۷ ثم أوجد القيمة العددية للناتج عند : \uparrow
- ا أوجد خارج قسمة : $1 v^7$ ص + 9 v ص $^7 17 v^7$ على 1 v ص (أ) أوجد خارج قسمة : $1 v^7$ ص $+ v^7$
 - $\frac{1}{\gamma}$ ، $\frac{1}{\gamma}$: نبین یقعان بین عددین نسبین یقعان بین
 - (1) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ١٥ ٢٩ ٢٠ ١٠ ٢٠ ٢٠ -
 - (ب) إذا كان الوسط الحسابي للقيم: ٨، ٧، ٥، ٩، ٤، ٣، ٤ + ٤ هو ٦ أوجد: قيمة ك



حارة المنيا محرسة بنى حسن الأشراف

. محافظة المنيا

أجب عن الأسئلة الأتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطأة:

- آ إذا كان: ك يمثل عددًا سالبًا فأي من الآتي يمثل عددًا موجبًا؟
- $\frac{2}{\Upsilon}(1)$ $2\Upsilon(2)$ $\Upsilon(2)$
 - العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{7}$ هو
 - $\frac{V}{\Lambda}$ (1) $\frac{\sigma}{\Lambda}$ (2) $\frac{\sigma}{\Lambda}$ (1)
- إذا كان المنوال للقيم: ٩ ، ١٥ ، ص + ١ ، ١٥ ، ٩ هو ٩ فإن : ص =
 - Λ(1) (-) (-) (-) (-)
 - اذا کان: ه ۱ = ه٤ ، ١ ← = ١ فإن: ب =
 - (c) $\frac{1}{9}$ (c) $\frac{1}{9}$ (c) $\frac{1}{9}$ (c) $\frac{1}{9}$ (c) $\frac{1}{9}$
 - (د) ه ° (د) ه ° (د) م ۱٬۰ (د) ۳ م ۱٬۰ (د)

آ أكمل ما يأتي :

- 1 الوسط الحسابي للقيم: ١٣ ، ١٢ ، ٨ ، ٧ هو
 - ۲٤ ع س ع ص ع = ۲ س مس × سسسس
 - ا ، ۱ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۸ ، (بنفس النمط)
 - كَ الوسيط للقيم: ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٣ ، ١٠ هو
- مساحة المستطيل الذي بعداه : (٢ -س ٣) ، (-س + ٥)
 تساوي ٢ -س + ٥١
- باستخدام خاصية التوزيع أوجد: $\frac{2}{9} \times 17 + \frac{2}{9} \times 9 \frac{2}{9}$
- (ب) اطرح: ٣ -س ص + ٢ ع من ٥ -س ٣ ص + ٤ ع
- (ج) حلل بإخراج ع.م.أ للمقدار : ٧ ١٠ ٢٥ ٢٠ س ؛ + ١٤ ٢٠ س
 - ٩ + (٣ + س) (٣ س) (٣ ٣) (س + ٣) + ٩
 - ثم أوجد القيمة العددية للناتج عندما : $-\omega=0$
 - $\frac{\xi}{r}$ ، $\frac{r}{0}$: وجد ثلاثة أعداد نسبية محصورة بين

- $\frac{\gamma}{T} | \zeta | \geq | \zeta | = \frac{\gamma}{T} \qquad \text{i.j.} \qquad \frac{\gamma}{T} = \frac{\gamma}{T}$ $\frac{\gamma}{T} (z) \qquad \frac{\gamma}{T} (z) \qquad \frac{\gamma}{$
 - آ أكمل ما يأتي :
 - ا ، ۱ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۸ ، (بنفس التسلسل)
- آ إذا كان الوسط الحسابى لدرجات خمسة طلاب هو ٢٠ درجة فإن مجموع درجاتهم يساوىدرجة.
 - ٣ أصغر عدد طبيعي هو
 - ٤ هو القيمة الأكثر تكرارًا بين القيم.
 - ه باقی طرح ۷ س من ۹ س هو
 - ۳ + ص + ۲ ص ۲ ، ۵ س ۲ ص + ۳
 - (-) استخدم خاصية التوزيع في إيجاد قيمة : $\frac{7}{6} \times 7 \times 7 \times \frac{7}{6} \times 6$
 - (+) اختصر إلى أبسط صورة : (Y + 7 7) (Y + 7 + 7) + V
 - علی 7 17 71 71 71 علی <math>7 71 71 علی 7 71 71 علی 7 71 71 71 علی <math>7 71 71 حیث -0 + 0
 - $\frac{0}{q} \div \left(\frac{7}{7} + \frac{2}{q}\right)$: أوجَد قيمة
 - (-1) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى : 77 -7 +7 -7
 - وجد عددین نسبیین یقعان بین: $\frac{\xi}{Y}$ ، $\frac{1}{Y}$
 - (ب) اطرح: س^۲ ه س من ۳ س^۲ + ۲ س
 - (ج) الجدول الآتي يبين درجات طالب في أحد الشهور:

علوم -	دراسات	رياضيات	إنجليزى	عربى	. illes
٩	٧	١.	٦	٨	الدرجة

أوجد: 🚺 المتوسط الحسابي لدرجات هذا الطالب.

٢ الدرجة الوسيطة.



 $\frac{1}{7}$ اذا کان : $\frac{1}{7}$ ، $\frac{1}{7}$ ، $\frac{1}{7}$ ، $\frac{1}{7}$ ، $\frac{1}{7}$. $\frac{1}{7}$ $\frac{1$

و (أ) الجدول التالي يبين درجات أحد التلاميذ في امتحان مادة الرياضيات:

أبريل	مارس	فبراير	ديسمبر	نوقمبر	أكتوبر	الشهر
٥٠	٤٤	٣٧	٤٢	٣٥.	٣.	الدوحة

أوجد الوسيط للدرجات مع التوضيح.

(ب) أوجد قيمة ك التي تجعل المقدار:

 $Y-\neq 0$ حیث Y+0 حیث Y+0 حیث Y+0



إدارة القوصية توجيه الرياضيات - مسائل

أجب عن الأسئلة الاتية ، (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

محافظة أسيوط

- <u>ا</u> أبسط صورة للعدد -ع هي
- $\frac{1}{\Lambda} (1) \qquad \frac{\xi}{\Lambda} (2) \qquad \frac{1}{\Upsilon} (1)$
 - {7.0}o[
- آ إذا كان الحد الجبرى: ٩ س ص من الدرجة الثالثة فإن: ك =
 - ر ک کا این کار کا این کا این
 - ﴿ إِذَا كَانَ تَرْتَيِبِ الْوَسِيْطِ لَمِمُوعَةً مِنَ القَيْمِ الْمُرْتِبَةِ هُو الرابِعِ فَإِنْ عدد هذه القيم يساوى
 - ٩ (١) ٢ (١)
 - المعكوس الجمعى للعدد $\left|\frac{-7}{V}\right|$ هو
 - $\frac{\lambda}{\Lambda}$ (7) $\frac{\lambda}{\Lambda^{-}}$ ($\frac{\dot{\tau}}{\tau}$) $\frac{\lambda}{\Lambda^{-}}$ ($\frac{\dot{\tau}}{\tau}$) $\frac{\lambda}{\Lambda}$ (1)





. 0(2)

إدارة البلينا توجيه الرياضيات - قطاع (†)

🚺 😁 محافظة سوهاج

أجب عن الأسئلة الأثية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

$$(-1)$$
 $\frac{\circ}{\circ}$ (-1) $\frac{7}{\circ}$ (-1) (-1) (-1)

$$\dot{V}(z)$$
 (د) $\dot{V}(z)$ (د) $\dot{V}(z)$


الشرط اللازم لجعل
$$\frac{-v+o}{v-v}$$
 = صفر هو $-v=0$

$$V-(1)$$
 $V(=)$ $0-(-1)$

$$1 \cdots (2) \qquad 1 \cdots (4) \qquad 1 \cdots (5) \qquad 1 \cdots (5)$$

أكمل ما يأتي :

- ١ ١ ، ه ، ٩ ، ١٣ ، (بنفس التسلسل)
- الوسط الحسابي لمجموعة من القيم يساوي
- العدد الذي يقع عند منتصف المسافة بين $\frac{7}{6}$ ، $\frac{3}{6}$ هو
 - 0 العامل المشترك الأعلى المقدار : ٢ ٠٠ + ٢ ص هو



(ب) اقسم: (۲۱ س^۲ + ۱۶ س^۲ – ۷ س^۱) علی ۷ س^۲ حیث س خ صفر

(v) بالخطوات المتتالية أوجد ناتج : $\left(\frac{1}{2} + \frac{7}{2}\right) \div \frac{77}{11}$ في أبسط صورة.

(۱) اختصر لأبسط صورة : (س + ۱) - س (س + ۲)

(ب) الجدول التالي يبين ساعات المذاكرة لكل من حسن وجمال خلال ٥ أيام :

٣	٤	۲	٥	7	3625
٦	٣	٥	٧	٤	- خاله

اكتب بالترتيب ساعات المذاكرة لكل منهما ثم أوجد ساعات المذاكرة الوسيط لكل منهما.



أجب عن الأسئلة الائتة :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين : $\frac{Y}{0}$ ، $\frac{3}{0}$ هو

- $(i) \frac{1}{\circ} \qquad (-i) \frac{7}{\circ}$
 -= ½ x · · , o s
- $\frac{\Upsilon}{5}(3) \qquad \text{if } \Upsilon \cdot (2) \qquad \text{if } \Upsilon \cdot (3)$
 - $\cdots = \frac{\gamma}{r} + \frac{r_{-}}{\circ} \quad \boxed{r}$
- $\Upsilon(2)$ \circ (-) $\frac{1}{\circ}$ (-)
- 1 (2) 7-(2) $\frac{1}{7} (4)$ 1-(1)

<u>1-</u> (1)

دطا	بر والإ	ے الک	حانات	امت	: 5

- (۱) اختصر لأبسط صورة : (س ۳) (س + ۳) + ۹ ثم أوجد القيمة العددية للناتج عندما: -س = -٣
- (ب) الجدول التالي يبين درجات أحد التلاميذ في مادة الرياضيات خلال العام الدراسي:

أبريل	مارس	فيراير	ديسمبر	توقمير	أكتوبر	
۲۸ -	٣.	77	۲٥	77	44	- 65,01°

أحسب الوسط الحسائي لدرجات التلميذ.



٠٢) محافظة الوادى الجديد

أجب عن الأسئلة الاتية . (يسهج باستخدام الألة الحاسبة)

أحازة الحاخلية

توحيه الرياضيات

اختر الإجابة الصحيحة من بن الإجابات المعطاة:

- ا إذا كان: $\frac{\delta}{1+\sqrt{1+\epsilon}}$ عددًا نسبيًا فإن: $-\omega \neq \infty$
- (ب) صفر (ج) ۲ 0(1)
 - آ المعكوس الضربي للعدد $\left(\frac{1}{\sqrt{1}}\right)^{\text{dual}}$ هو
- (ب) ۲ (ب) ۲ (۲ (۱) 1-(2)
 - \mathbb{T} إذا كان : $\frac{\gamma}{2}$ س = ۱۰ فإن : $\frac{\pi}{2}$ س =
- (ب) ۲۰ (ب) ۲۰ (ج) ه . 7 (3)
 - ٤ الوسيط للقيم: ٤ ، ٨ ، ٣ ، ٥ ، ٧ هو
- (د) ۷ (ب) ٤ (ج) ه · T (1)
 - ٥ الوسط الحسابي للقيم: ١ ، ٦ ، ٤ ، ٨ ، ٦ هو
- Yo (2) (پ) ۲ (ج) ۸ 0(1)

 - - فان : △ = ------
- (ب) ۱۵ Y- (i) 0(1) (ج) ۱۰



- إذا كان ثمن خمسة أقلام بنيهًا فإن ثمن ٥٠ قلمًا من نفس النوع يساوى جنبهًا.
- $\frac{\circ \cdot}{\circ} (1) \qquad \frac{\circ \cdot}{\circ} (2) \qquad \frac{\circ \cdot}{\circ} (2$
- [1] إذا كان ترتيب الوسيط لجموعة قيم مرتبة هو الرابع والخامس فإن عدد هذه القيم يساوي
 - (پ) ۷ ٤(١) (د) ۹ (ج) ٨

أكمل ما بأتي:

- [إذا كانت درجة الحد الجبرى: ٥ ٢ م هي درجة الحد الجبرى: ٣ ٥ م ص
 - ۲۵ + ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ [۲
 - ٣ ه چم = کچم
 - آذا كان المنوال للقيم: ١٥، ٩، -س + ١، ٩، ١٥ هو ٩ فإن : س = ----
- ٥ إذا كان الوسط الحسابي لأطوال أضلاع مثلث يساوى ٥ سم فإن محيط المثلث يساوي ستسسس سم
 - $\frac{\circ}{\sqrt{1}} + \circ \times \frac{\circ}{\sqrt{1}} + \wedge \times \frac{\circ$ $\frac{\tau}{\epsilon}$ ، أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين : $\frac{1}{\tau}$ ، أ
 - $\frac{\tau}{\psi}$ ، $\frac{1}{\psi}$ ، $\frac{1}{\psi}$ ، $\frac{\tau}{\psi}$ ، $\frac{\tau}{\psi}$ أوجد في أبسط صورة القيمة العددية للمقدار : $(1--) \div -$
- مستطیل مساحته (۲۶ $-0^7 + ۱۸ 0^7 + ۶۲ 0$) سم وعرضه 7 0 سیم. أوجد طول المستطيل بدلالة -س
 - (ب) إذا كان: س + ص = ٣ ، ٩ ب = ٤ . أوجد القيمة العددية للمقدار : $(-\omega + \omega) - (-\omega + \omega)$



آ أكمل ما يأتي :

- = · , \\ // \(\cdot \)
- ۷ آ بر ۳ ص × × غ ۲۱ بر۳ ص
- التسلسل) ۸،۵،۳،۲،۱۱ ، ۳
 - عامل الحد الجبرى : ه س ص فه هو

(1) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ١٤ س ص ٣ ص ٣٠ س ص ٢٠ ب ٧ س ص

- (ب) ما زیادة: ٧ س + ه ص + ٢ ع عن ٢ س + ٦ ص + ع ؟
- (ج) أوجد خارج قسمة : س + ۲ على س + ۱ حيث س ≠ -۱ (ج)
 - $V + (T + \omega T)$ (المحتصر لأبسط صورة : ($V \omega T$) (المحتصر لأبسط صورة : $V \omega T$) (المحتصر القيمة العددية للناتج عند : $V \omega = -T$
 - (ب) باستخدام خاصية التوزيع وبدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد ناتج:

$$\frac{\gamma\gamma}{r\prime} \times \frac{\prime\prime}{V} + \frac{\gamma\gamma}{r\prime} \times \frac{\prime\prime}{V} - \frac{\gamma\gamma}{r\prime} \times \frac{\gamma}{V}$$

- (أ) أوجد عددًا نسبيًا يقع عند ربع المسافة بين : $\frac{1}{Y}$ ، $\frac{1}{Y}$ (من جهة الأصغر)
- (ب) الجدول الآتي يبين درجات طالب في امتحان الرياضيات في ٦ أشهر دراسية :

أبريل	مارس	فبراير	ديسمبر	نوقمبر	أكتوبر	الشفرد
٥٠	٤٤	۲۷	٤٢	۲٥	۲:	الذرحة

احسب الوسط الحسابي للدرجات.



- - مراجعة سريعة لأهم النظريات والنتائج والقواعد في الهندسة.
 - مغاهیم ومهارات أساسیة تراکمیة.
 - نماذج امتحانات طبعًا لمواصفات الورقة الامتحانية (عدد ۲ نموذج).
 - نماذج امتحانات الكتاب المحرسي (عدد ۲ نموذج).
 - امتحانات بعض مدارس المحافظات (عدد ۲۰ امتحانًا).



الحد الجبرى: ٦-٠٠ ص من الدرجة (ز) الثالثة. (د) الرابعة. (ج) الخامسة. (د) السادسة.

🧃 العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين 😾 ، 🤌 هو

 $\frac{\circ}{\mathsf{YV}} \; (\, \bot) \qquad \qquad \frac{\$}{\$} \; (\, \div) \qquad \qquad \frac{\mathsf{Y}}{\mathsf{Y}} \; (\, \dag)$

المعكوس الضربى للعدد $\left(rac{1}{7}
ight)^{
m main}$ هو

1-(3)

(+) (+)

 (\cdot) (\cdot) (\cdot) (\cdot) (\cdot)

و الوسيط القيم: ٥ ، ٤ ، ٧ هو

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

17 (4)

إذا كان الوسط الحسابي للقيم: ٣ ، ٥ ، -٠٠ + ٢ هو ٤

فإن الوسط الحسابي للقيمتين: ٥ - حِس ، ٥ + ٢ حِس هو

 $\Upsilon_{(2)}$ $\Upsilon_{(2)}$ $\Upsilon_{(1)}$

 $\frac{r}{V} - 7 \times \frac{r}{V} + 7 \times \frac{r}{V} \times \frac{r}{$

 $rac{\lambda}{arphi}$ ، $rac{\lambda}{arphi}$ ، in this is in the case of $rac{\lambda}{arphi}$. $rac{\lambda}{arphi}$, $rac{\lambda}{arphi}$

عن ٢ - س + ٦ ص + ع عن ٢ - س + ٦ ص + ع ؟ عن ٢ - س + ٦ ص + ع ؟ عن ٢ - س + ٦ ص + ع ؟ عن ٢ - س + ٢ ص + ع ؟ عن ٢ - س

 $\{\omega\}$ أوجد خارج قسمة : ١٤ - ω ص - ω ص - ω + ω - ω على ω - ω حیث ← ن مح صفر ، ص مح صفر

ه ﴿ أَ) اختصر لأبسط صورة : (س – ٣) (س + ٣) + ٩

ثم أوجد قيمة الناتج عندما : -س = ٥

 $\{ _{\odot} \}$ إذا كان الوسط الحسابي للقيم : ٨ ، ٧ ، ٥ ، ٩ ، ٤ ، ٣ ، ك + ٤ هو $\{ _{\odot} \}$ فأوجد: قدمة لك

امتحانات بعض مدارس المحافظات فى الجبر والإحصاء



محافظة القاهرة



D(2)

٤ (د) ع

9 (4)

 $\frac{V}{\lambda}$ (7)

أجِب عن الأسئلة الأتية :

🥻 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

أبسط صورة للعدد $\frac{-3}{\lambda}$ هي

 $\frac{\chi}{\sqrt{1-\chi}} (\dot{z}) \qquad \frac{\chi}{\sqrt{1-\chi}} (\dot{z}) \qquad \frac{\chi}{\sqrt{1-\chi}} (\dot{z}) = \frac{1}{2} (\dot{z}) + \frac{1}{2} (\dot{z}) = \frac{1}{2} (\dot{z}) + \frac{1}{2} (\dot{z}) = \frac{1}{2$

{7.0}

 $\supset (-1) \qquad \qquad \not \ni (-1) \qquad \qquad \ni (-1)$

٣ إذا كان: الحد الجبرى ٩ س ص من الدرجة الثالثة

(۱) ۱ (۱) ۲ (چ)

2 إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم المرتبة هو الرابع

فإن عدد هذه القيم يساوى

٧ (ټ) ٤ (ټ) ۲ (۱),۱

المعكوس الجمعى للعدد \ - ٢ | هو

 $\frac{\sqrt{-}}{7} (\Rightarrow) \qquad \frac{\sqrt{-}}{7} (\downarrow) \qquad \frac{7}{7} (\uparrow)$

 $(\dot{\tau})$ $\frac{\lambda}{\lambda}$ $(\dot{\tau})$ $\frac{\lambda}{\lambda}$ $(\dot{\tau})$ 7 (2)

الله أكمل ما يأتي:

(بنفس التسلسل) ۸،۵،۳،۲،۱۱

آ إذا كان الوسط الحسابي لدرجات خمسة طلاب هو ٢٠ درجة

فإن مجموع درجاتهم يساوىدرجة.

٣ أصغر عدد طبيعي هو

- ٤] هو القيمة الأكثر تكرارًا بين القيم.
 - ٥ باقى طرح ٧ س من ٩ س هو
- (۱) اجمع المقدارين: ٣ ٠٠ ١ ٥ ٠٠ ٢ ٠٠ ٣ ١
 - $\frac{7}{6} 8 \times \frac{7}{6} + 7 \times \frac{7}{6}$: استخدم خاصیة التوزیع فی ایجاد قیمه استخدم خاصیه التوزیع
 - (-+) اختصر إلى أبسط صورة : (7 + 7 7) (7 + 7 + 7) + V
- (1) أوجد خارج قسمة : ۲۶ س -1 س -1 س على -1 س اوجد خارج قسمة -1
 - (\cdot,\cdot) أوجد قيمة : $(\frac{3}{4} + \frac{7}{7}) \div \frac{6}{4}$
 - (=) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى : 77^{7} -7^{7} -7^{7}
 - $\frac{T}{\xi}$ ، $\frac{1}{\gamma}$: أوجد عددين نسبيين يقعان بين
 - (ب) اطرح: س من ۳ س ۲ + ۲ س
 - ($_{+}$) الجدول الآتي يبين درجات طالب في أحد الشهور :

علوم	دراسات	رياضيات	إنجليزى	عربی	المادة
٩	٧	١.	٦	٨	الدرجة

أوجد: [المتوسط الحسابي لدرجات هذا الطالب.] الدرجة الوسيطة.



أجب عن الأسئلة الأتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

٢ محافظة القاهرة

- \cdots إذا كان المنوال للقيم : \vee ، \wedge ، \rightarrow + \wedge هو \wedge فإن : \rightarrow = \bigcirc
 - ٧(١) ٧ (١)
 - آ العدد النسبى يكون سالبًا إذا كانت : س.......... صفر.
 - =(1) > (2) > (3)

- $-\frac{2}{2}$ إذا كان: $\frac{-0+3}{-0-7}$ ليس عددًا نسبيًا فإن: -0-7=
- $\mathcal{E}(\varphi) \qquad \mathcal{T}(\varphi) \qquad \qquad \mathcal{I}(1)$
- العدد النسبى الذي يقع في منتصف المسافة بين العددين $\frac{\pi}{V}$ ، هو $\frac{\delta}{V}$
 - $\frac{\xi}{V}(\omega) = \frac{\xi}{V}(\omega) \qquad \frac{\xi$
 - $\dots = (1 \cdot \cdot 7) + (7 7) + (7 7) + (7 7)$
 - ۱۰۰-(۱) ۱۰۰-(۱)
- مستطیل مساحته ۳۵ 7 سم ، وطوله ۷ 0 سم ، فإن عرضه = 1
 - (۱) ٥ س (ب) ٣٥ (ب) ص د (ج) عب س د (۱۲ ص

الكمل ما يأتي:

- ٨ ١ حس تزيد عن ٤ حس بمقدار
- آ إذا كانت درجة الحد الجبرى 7 س 9 ص 1 هى 8 فإن : م =
 - 🍸 الوسيط للقيم: ٥ ، ٤ ، ١ ، ٨ ، ٢ هو
 - الوسط الحسابي للقيم: ۲، ۸، ه هو
 - o المعكوس الجمعى للعدد $\left(rac{\circ}{ee}
 ight)^{
 m cut}$ هو
- $\circ imes rac{\lambda \cdot}{\lambda} + rac{\circ}{\lambda} \vee imes rac{\circ}{\lambda}$: باستخدم خاصية التوزيع أوجد ناتج ما يلى فى أبسط صورة و
- - (ج) حلل بإخراج ع.م. أ للمقدار: ١٢ -س ص + ١٨ -س ص
- $\left(\frac{1}{6}\right)$ أوجد خارج قسمة : ٥ - $\sqrt{1}$ 11 - $\sqrt{1}$ على ٥ - $\sqrt{1}$ 1 (حيث - $\sqrt{1}$ خواج قسمة : ٥ - $\sqrt{1}$)
 - $\frac{\Upsilon}{(+)}$ ا اذا کان: $\frac{V}{(+)} = -\infty$ صفر فأوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين: $\frac{1}{(+)} = -\infty$
 - (ج) إذا كانت : س + ه ص = ٦ ، ع = ٢
 - أوجد القيمة العددية للمقدار : -u + o



- (۱) اختصر لأبسط صورة: (٣ س + ۱) ٣ س (٣ س + ٢)
- (ب) إذا كان الوسيط للقيم : ص + ٤ ، ص + ٧ ، ص + ١ هو ٧ فأوجد : قيمة ص
 - (ج) إذا كان المتوسط الحسابي للقيم: ك + ٣ ، ١ ، ٢ ، ٩ ، ٨ هو ه

فأوجد: قيمة ك



إحارة مصر الحديدة

. **f** = (2)

أجِب عن الأسئلة الأتية :

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- $\mathbf{q} : \mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{q} = \mathbf{q}$ فإن : $\mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{q} = \mathbf{q}$ فإن : $\mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{q}$
- (1) صفر (+)
 - آ درجة الحد الجيري ٢ س ص مي
- (د) الخامسة. (١) الثانية. (ب) الثالثة، (ج) الرابعة.
 - $\overline{\gamma}$ إذا كان : $\frac{\gamma}{\lambda}$ س = ۱۰ فإن : $\frac{\overline{\gamma}}{\lambda}$ س =
 - (ر) ۲۰ (ج) ۲۰ (ب) ۲۰ (۱)
 - العدد النسبي الذي يقع في منتصف السافة بين $\frac{1}{\pi}$ ، $\frac{6}{\pi}$ هو
 - $\frac{9}{7} \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix}$
- $\Upsilon(\varphi)$ $\Upsilon(\psi)$ $\Upsilon(1)$ (د) عدد لا نهائي.
 - ٦ إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الرابع
 - فإن عدد هذه القيم هو
 - (د) ۹ (۱) ۲ (ج) ۲ (ج) ۲ (۲)

ا أكمل ما يأتي:

- - آ ربع العدد ۲۰۶ یساوی

- المعكوس الجمعى للعدد $\left| \frac{\mathsf{T}}{o} \right|$ يكون
- ٤ ٢٠٪ من العدد ٢٠٠٠ = ٥٠٪ من العدد
- ه ٢ س + ٣ ص أكبر من ٣ ص ٢ س بمقدار
- $\frac{\circ}{V} \times Y + \frac{\circ}{V} \frac{\circ}{V} \times Y :$ استخدم خاصیة التوزیع لإیجاد قیمة $\frac{\circ}{V} \times Y + \frac{\circ}{V} \frac{\circ}{V} \times Y :$
- (م) إذا كانت مساحة المستطيل Y V + V V V وحدة مربعة ، وكان طوله - + ٥ وحدة طول. أوجد عرض المستطيل.
 - (۱) أوجد في أبسط صورة : (۲ ۲ ۲ ۲ ۲) (۲ ۲ ۳ ۲ ۲)
 - () حلل المقدار التالي باستخدام اخراج ع. م. أ : ٢ - ١٠ - ٦ - ٣ - ١٢ - ١٢ - ٢٠ ص
- - $\Upsilon = -1$ ، $\alpha = -1$ ثم احسب قیمة الناتج عندما : $\alpha = -1$
 - (ب) إذا كان الوسط الحسابي القيم: ٨ ، ٧ ، ٥ ، ٩ ، ٤ ، ٣ ، ك + ٤ هو ٦ أوجد: قيمة *ك*

إدارة الهرم

مدرسة فصل الحديثة

محافظة الحيزة

أجب عن الأسئلة الأتية :

- العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين : $\frac{\lambda}{\lambda}$ ، $\frac{\delta}{a}$ هو
- $\frac{9}{77} (1) \frac{9}{77} (2) \frac{3}{7} (2)$
- ٢] إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو ٦ فإن عدد هذه القيم هو ...
 - ١١٠ ١١ (خ) ١٢ (خ) ١٢ (خ) ١٢ (١١)
 - الحد الجبرى: ٢ ٣ ص من الدرجة
 - الثانية. (-) الثالثة، (-) الرابعة. (-) الخامسة.

0 (2)

- (د) صفر (ج) ۲ · (د) ٥
- إذا كان المنوال للقيم: ٧ ، ه ، س + ٤ ، ه ، ٧ هو ه فإن : س =
 - (ب) ۶ (ج) ه د د د د د د ۲ 1(1)

 - Yo- (a) 1. (a)

أكمل مكان النقط:

- ۲۶ بن عس = ۲ س × سسست ا
- ٢ الوسط الحسابي للقيم: ٣، ٣، ٩، ٤، ٨ يساوي
 - س باقی طرح ٣ س من ٢ جن يساوي
- - باستخدام خاصیة التوزیع أوجد ناتج: $rac{7}{V} imes 7 imes rac{7}{V} imes 7 imes rac{7}{V}$ باستخدام خاصیة التوزیع
 - $\left(\begin{array}{c} \frac{\mathsf{Y}}{\mathsf{Y}} \end{array} \right)$ أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين : $\frac{\mathsf{Y}}{\mathsf{Y}} > \frac{\mathsf{Y}}{\mathsf{Y}}$
 - (أ) أوجد حاصل ضرب : (-س + ۲) (-س ٥)
 - (ب) اطرح: ۱۹۹ ۲ ب ٦ ح من ۲۹ ٦ ب + ٤ ح
- (أ) أوجد خارج قسمة: ١٤ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ على ٧ ص ص (حيث س ≠ صفر ، ص ≠ صفر)
 - (ب) سجلت درجات أحد التلاميذ في مادة الرياضيات في ٦ شهور دراسية فكانت : ۳۰، ۳۰، ۳۰، ۲۷، ۵۶، ۵۰ أوجد الوسيط والوسط الحسابي للدرجات السابقة.

محافظة الجيزة



أجب عن الأسئلة الآتية .

🊹 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- \square انا کان: $-\omega \times \frac{\delta}{a} = 1$ فإن: $-\omega = \dots$
 - $\mathbf{q}(\mathbf{\psi})$ $\frac{1}{\mathbf{q}}(\mathbf{1})$ $\frac{9}{2}$
- (ب) ه (ج) م (ج) م (۱) V(2)
 - Ψ اِذا کان: $\frac{\gamma}{\sqrt{2}} = \frac{\gamma}{2}$ فإن: $\frac{\gamma}{2} = \frac{\gamma}{2}$
- $\frac{\hat{\mathbf{L}}}{L}(\tau)$
- الألية كان الحد الجبرى: ٩ س ص من الدرجة الثالثة فإن : *لہ*=
 - ۲ (ب) ۲ (۱) 8(2)
 - الوسط الحسابي للقيم: ۲،۲،۳،۲،۷ هو
 - (ب) ۳ (ج) ع Y(1) 0(1)
 - يزيد عن $\frac{-7}{2}$ بمقدار
 - (i) and (-i) $\frac{3}{2}$ (-i)1(2)

اً أكمل:

- آ إذا كان ترتيب الوسيط لعدد من القيم هو الرابع عشر فإن عدد هذه القيم
- 🍸 العدد النسبي الذي يقع عند منتصف المسافة بين العددين 😽 ، 🝾 هو
 - ع و س م السيس ١٥ س ص م ع السيس ١٥ س ص السيس السي
 - ه (س − ه) (س + ه) = س^۲ −



- $\Upsilon+\omega+\gamma-\omega+\delta$ ، $\delta-\omega+\gamma$ ، $\delta-\omega+\gamma$ ، $\delta-\omega+\gamma$
- $\frac{r}{17} 7 \times \frac{r}{17} + V \times \frac{r}{17} \times V + \frac{r}{17} \times 7$ استخدم خاصیة التوزیع لإیجاد قیمة :
 - $rac{1}{r}$ ، أوجد عددين نسبيين يقعان بين : $rac{1}{r}$
 - (۱) اختصر لأبسط صورة : (س + ۲) ٤ (س + ۱) $\mathfrak{r}=\mathcal{V}$ ثم أوجد قيمة المقدار عندما : $\mathcal{V}=\mathcal{V}$
 - (ب) اطرح: ٢٠٠٠ ص + ٢ع من ه س ٣ ص + ٤ع
 - $\frac{1}{T} = 2 \cdot \frac{1}{T} = 2 \cdot T = \frac{1}{T}$
- ور أ) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى : ۷ م - 7 + ۱۲ م 7 -
- (ب) إذا كان المنوال للقيم : 1 + V + V + V + V + V + V يساوى ١٠ فأوجد : قيمة 1
- (ج) أوجد خارج قسمة : (۲۷ س ۲۰ ۲ س $+ 7 0^7 + 7 0^7 + 7 0^7$ (حيث 0 + 0 + 0 + 0 + 0



أجب عن الأسئلة الآتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- - ١٠ (ع) ٥ (غ) ٢٠ (ټ) ١٥ (١)
 - ا الوسط الحسابي لمجموعة القيم: ١ ، ١٠ ، ٥ ، ٨ ، ٦ هو
 - $\mathsf{A}(\mathsf{a}) \qquad \mathsf{A}(\mathsf{a}) \qquad \mathsf{A}(\mathsf{b}) \qquad \mathsf{A$

 - $\frac{\circ}{\P} \ (\circ) \qquad \qquad \frac{\$}{\P} \ (\circ) \qquad \qquad \frac{\P}{\P} \ (\uparrow)$
 - ك ياقى طرح: ٤ س ص من ٧ س ص هو
 - (۱) –۱۱ س ص
 - (ع) ٣- عن ص

- ۰۰ ۱۰ و ب ۲۰ ۲۰ س = ۳ م ۲۰ س
- 10 (3) 10 (a) ۲۹ ه (پ)
 - $\dot{\gamma} + \dot{\gamma}$, $\dot{\gamma} = \dot{\gamma}$
- ٠, ٣٧ (ب) ١ (١) 1 $\frac{1}{T^*}$ (4)

اً أكمل:

- آ إذا كان المنوال لمجموعة القيم: V ، o ، Y T ، o ، V هو V
 - \forall انا کان: $\frac{3}{(1-\alpha)^2}$ عددًا نسبيًا فإن: \forall
- ع درجة الحد الحبرى : ٥ س مى ومعامله هو ٤
 - 10 + Y Y = (0 + 0-) (Y 0- Y) 0
- ور أ) أوجد خارج قسمة : ١٤ - $\sqrt{7}$ ص + $\sqrt{7}$ ص + $\sqrt{7}$ ص على $\sqrt{7}$ ص ص على $\sqrt{7}$ (میث س ≠ · ، ص ≠ ·)
 - (ب) اطرح: ۲۹-۲ب+ من ۱۹۴۰ من
 - ٤ + (٢) اختصر لأبسط صورة : (→ ۲) (→ ۲) (€

ثم أوجد القيمة العددية للناتج: إذا كانت س = ٣٠

- $\left(ullet
 ight)$ استخدم خاصية التوزيع لتسهيل إيجاد ناتج : $rac{\circ}{
 m V} +
 m V imes rac{\circ}{
 m V}$
 - $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، $\frac{2}{\sqrt{3}}$
- (ب) إذا كان الوسط الحسابي لدرجات أحد الطلاب في ٥ شهور دراسية بمادة الرياضيات ٣٦ درجة ، فما الدرجة التي يجب أن يحصل عليها هذا الطالب في الشهر السادس ليكون متوسط درجاته في الشهور الستة ٣٨ درجة ؟



محافظة القليوبية

أجب عن الأسئلة الأثية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- المعكوس الضربي للعدد الله هو المستنسبة $\frac{\xi}{r} \ (\Rightarrow) \qquad \qquad \frac{r}{\epsilon} \ (\psi) \qquad \qquad \frac{\xi}{r} \ (\uparrow)$
- 🗻 قيمة الرقم ٣ في العدد ١٩٢٠ ، هي
- $\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}}(\omega) \qquad \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}}(\omega) \qquad \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}}(\omega)$
 - الناكان: س حصفر حص ، اس ا>ص
 - قَإِنْ : سِ + صمفر
- $=(2) \qquad \geq (2) \qquad \leq (1)$
- العدد $\frac{-0-3}{0}$ لا يعبر عن عدد نسبى إذا كانت -0=(د) –٤
 - (ب) ٥ (ب) ٥ (١)
 - ٥ المنوال للقيم: ٤ ، ٢ ، ٩ ، ٢ ، ٧ هو
 - (ب) ۶ (ب) ۴ (ج) ۲
- (L) -37 :-(ب) ۱٦ 17-(1)

🕻 أكمل ما يأتي :

- ا إذا كان الوسط الحسابي للأعداد ٧ ، حس ، ٧ هو ٧ فإن : حس =
 - آ ۲,۰ = ······ (فی صورة را)
 - $(\cdots 1) (-\omega + 7) = (-\omega^{7} + \omega^{7}) = (-\omega^{7} + \omega^{7})$
 - 0 =× Y [£]
 - ٥ إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو السابع فإن عدد هذه القيم
 - يساوى

<u>r</u> (2)

· V(2)

7 (1) اطرح: 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 من 7 - 7 - 7 - 7 - 7

- (ب) باستخدام خاصية التوزيع وبدون الآلة الحاسبة أوجد ناتج:
 - $\frac{V}{V} \times \frac{V}{P} + \frac{V}{V} \times \frac{V}{P} \times \frac{V}$
 - ∀ + (۲ + س + ۲) (۲ س + ۲) (۲ س + ۲) + ∀

 ∀ + (۲ + س + ۲) (۲ س + ۲) + ∀

 √ + (۲ + س + ۲) + ∀

 √ + (۲ + س + ۲) + ∀

 √ + (۲ + س + ۲) + ∀

 √ + (۲ + س + ۲) + ∀

 √ + (۲ + س + ۲) + ∀

 √ + (۲ + س + ۲) + ∀

 √ + (۲ + س + ۲) + ∀

 √ + (۲ + س + ۲) + ∀

 √ + (۲ + س + ۲) + ∀

 √ + (1 + س + ۲) + ∀

 √ + (1 + س + ۲) + ∀

 √ + (1 + س + ۲) + ∀

 √ + (1 + س + ۲) + ∀

 √ + (1 + س + ۲) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓ + (1 + 1) + ∀

 ✓
 - وأوجد القيمة العددية للناتج عند س = -١
 - $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{2}$ العددين : $\frac{1}{2}$
- ومن $\neq 0$ ومن $\neq 0$ علی $\forall 0$ وجد خارج قسمة : ۲۷ س $\forall 0$ ومن $\forall 0$
 - (ب) أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال للقيم:
 - 0.7.2. ٧.2. ٢.٣.١.. ٤.0



أجب عن الأسئلة الأتبة :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 🚹 المعكوس الجمعي للعدد صفر هو
- (ب) غير موجود (ج) /
 - ا هو المعكوس الجمعى للعدد هو المعكوس الجمعى العدد المعكوس الجمعى العدد المعكوس الجمعى العدد المعتمد المعتمد
 - $\frac{7}{7}(\Rightarrow) \qquad \frac{7}{7}(\downarrow) \qquad \frac{7}{7}(\uparrow)$
 - ٣] المعكوس الضربي للعدد صفر هو
- (ب) غير موجود (ج) [1-(2)
- ا إذا كان الحد الجبرى: ٦ -س ص من الدرجة الخامسة
 - (پ) ۲ • (1) (چ) ۳ 0(2)
 - و زيادة ٢ س عن ٣٠ س هي
 - (ب) س (ج) ه س (1) س
 - (د) ٥ -س

44

1-(1)

1 (13)



- آ إذا كان المنوال للقيم: ١، ٢، ٣، ٤، س هو ٢ (د) ع (ب) ۲ (ج) 1(1)
 - ا أكمل ما يأتي:
 - آ إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الخامس فإن عدد هذه القيم يساوى
 - آ إذا كان: $\frac{-v o}{v + v + v}$ عددًا نسبيًا = صفر فإن: $\frac{-v o}{v}$ عددًا نسبيًا
 - ٣ ٢ س ص × سسس = ١٢ س ص
 - $\frac{1}{2}$ العدد الصحيح بين $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ، $\frac{1}{2}$ هو
 - المحايد الضربي في ن هو
 - الرح: ٣-٠٠ م ص ٣ع من ٣-٠٠ ع الطرح: ٣-١٠ ع
 - $\frac{7}{10}$ + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 استخدم خاصیة التوزیع لإیجاد قیمة : 0
- ور أ) أوجد خارج قسمة : $7 \omega^7 + 77 \omega + 7$ على $7 \omega + 7 \left(-2 \omega^2 \omega + \frac{7}{7} \right)$
 - (ب) اختصر لأبسط صورة : $(-w + Y)^{Y} -w^{2}$
 - ور أ) أوجد العدد الذي يقع في ربع المسافة بين: $\frac{1}{7}$ ، $\frac{7}{3}$ من جهة الأكبر.
 - (()) احسب الوسط الحسابي للأعداد : ٥ ، ٧ ، ١ ، ٢

محافظة المنوفية

إدارة شبين الكومر

أجب عن الأسئلة الأتية : (يسوح باستخدام الآلة الحاسبة)

- اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
 - ٢٠٠٠ كيلو جرام = جرام
- YV0. (1) **70・・ (デ) アアアロ (デ) ア・・・ (1)**

- ر ، بين سود النسبى $\frac{\gamma}{\pi}$ يقع عند منتصف المسافة بين س فإن : س = سسسس
- $\frac{\circ}{7} (\Rightarrow) \qquad \frac{7}{5} (\psi) \qquad \frac{1}{7} (\dagger)$ $\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$ (7)
 - ٣ المنوال للقيم: ٣ ، ٤ ، ٧ ، ٤ ، ٩ هو
- (أ) ٣ (ج) ۷ 9 (2)
 - $\frac{1}{\sqrt{\Lambda}} = \frac{7}{5} + \frac{7}{5} \left(\frac{5}{5} \right)$
- ٦ (١) ٣ (١) (چ) ۱۲ YE (J)
 - الحد الجبرى: ٧ -س٢ ص٤ من الدرجة
- (أ) الثالثة. (ب) الرابعة. (ج) الخامسة. (د) السادسة.
- هو المعكوس الجمعى للعدد النسبى (حيث $-u \neq \pi$)
- $\frac{r}{r+r} (\Rightarrow) \qquad \frac{r-r}{r+r-r} (\Rightarrow) \qquad \frac{r}{r+r-r} (\dagger)$

أكمل ما يلي:

- ال ۲ ، ۵ ، ۸ ، ۱۱ ، (بنفس التسلسل)
- آ إذا كان الوسط الحسابي للقيم: ٣ ، ك ، ٣ هو ٢ فإن: ك =
 - γ $= \frac{\xi}{V} + \frac{r}{V}$
 - (حيث س خ س = (حيث س خ · (حيث س خ ·)
- إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الرابع فإن عدد القيم التي تليه بعد ترتيبها
 - $\frac{1}{\pi}$ ، $\frac{\xi}{a}$: أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين أوجد ثلاثة
 - (\cdot,\cdot) باستخدام خاصية التوزيع أوجد قيمة : $\frac{\circ}{\lambda} \times \lambda + \lambda \times \lambda$
 - $\frac{1}{4}$ فأوجد قيمة المقدار: $\frac{7}{6}$ ، $\frac{7}{6}$ ، $\frac{7}{6}$ ، $\frac{7}{6}$
 - و أ) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى : ٦ س 17 7 + 9 س
 - (-1) ما نقص: 7 7 7 7 عن 9 7 7 7
 - (----) اختصر لأبسط صورة : $(----)^{7}$ + $(-----)^{7}$



(أ) أوجد خارج قسمة: Y - U' + Y' - U + 0 على -U + 0 (حيث $-U \neq -0$)

(ب) أوجد الوسط الحسابي والوسيط للقيم الآتية موضحًا خطوات الحل: 16 E 6 9 6 17 6 V



محافظة الغربية

أجب عن الأسئلة الآتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

المعكوس الضربى للعدد : $\left(rac{-r}{o}
ight)$ هوا

$$\frac{r}{r} (a) \qquad \frac{r}{r} (a) \qquad 1 - (a) \qquad 1 (1)$$

$$(\iota)$$
 (ι) (ι) (ι) (ι) (ι)

$$(-1)$$
 (-1) (-1) (-1)

$$(-1)$$
 (عفر (-1) (-1) (-1)

آ إذا كان الحد الجبرى ه
$$-0^7$$
 $ص^{6+1}$ من الدرجة الخامسة فإن : $6 = 0$

الله أكمل ما يأتي:

$$(\cdot \neq 0 \rightarrow 1 + 1 \rightarrow 1)$$
 (ع جن $+ 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1$ (حیث $-1 \rightarrow 1 \rightarrow 1$)

- ٤ الوسط الحسابي للقيم : ٨ ، ٤ ، ٣ هو
- - $rac{\circ}{1}$ ۲٤ imes $rac{\circ}{1}$ + ۱۰ imes $rac{\circ}{1}$: یجاد ناتج یابد ناتج الخواص فی ایجاد ناتج المتحدم الخواص فی ایجاد ناتج المتحدم الخواص فی ایمان المتحدم الخواص فی ایمان المتحدم الم
 - (ب) اجمع: ٥ س ٤ ص + ٩ ع مع ٣ س + ٤ ص ٣ ع
- کا (أ) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ٣٥ -س ص ٢١ -س ص + ١٤ -س ص
 - (ب) اختصر لأبسط صورة: (س + ۳) (س ۳) + ۹ ثم أوجد قيمة الناتج عندما: ـس = ٥
- $\frac{1}{2}$ (أ) أوجد خارج قسمة : ۲ $\frac{1}{2}$ + ۱۱ $\frac{1}{2}$ على ۲ $\frac{1}{2}$ + ۱ (حيث $\frac{1}{2}$)
- (ب) [إذا كان الوسط الحسابي للقيم: ٦، ٥، س، ٢ هو ٥ أوجد: قيمة س إذا كان الوسيط للقيم: ك + ٩ ، ك + ٣ ، ك + ٨ ، ك + ٢ ، ك + ٧
 - هو ١١ أوجد: قدمة ك

محافظة الدقهلية

إدارة نيروه - توجيه الرياضيات

Y1 (2)

(L) 0 97

أجب عن الأسئلة الآتية :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

ا إذا كان: $\frac{V}{V} = \frac{\omega}{V}$ فإن: $\omega = \cdots$

(۱) ۳ (چ) ۱۲ (پ)

 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ عدد طبیعی إذا كان حاددًا طبیعیًا یساوی ...

(ب) ۲ (ج) ٦ ٤ (١٠) (د) ۳

(ج) ۲ **۹**۳ (1) 0 97 (4)

1-=× ٣ [£]

1- (2) $\Upsilon(\Rightarrow)$ $\frac{1}{\Upsilon}(\varphi)$ **7**-(1) مديرية التربية والتعليم

٠ (د)٧



۲ ص =	کان : -س +	ه إذا
	۲ ص =	کان : -س + ۲ ص =

- 10(1) (ج) ۱۱ (ب) ٢ 0(1)
- إذا كان الوسط الضمابي للقيم: ٣، ه، ٠٠٠ هـ ٣ فإن: -س =
 - 0(2) (ج) ع (پ) ۳ 1(1)

🔏 أكمل بالإجابة الصحيحة :

- آ معك ٦٠ جنيهًا ، صرفت ٢ المبلغ فإن المتبقى معك هو جنيهًا.
 - آ المنوال للقيم: ٣٢ ، ٣١ ، ٣١ ، ٣٣ هو
 - \mathfrak{T} إذا كان : $\frac{3}{2} + \psi =$ صفر فإن : $\psi =$
 - ٤ الوسيط للقيم: ٣ ، ٦ ، ٤ ، ٦ ، ٢ ، ٦ هو
 - ٥ ٢ ٢ + ٤ تقل عن ٥ + ٣ ٢ بمقدار

$\circ \times \frac{7}{V} + \frac{\circ}{V} + \frac{2}{V} \times \frac{\circ}{V}$ استخدم خاصية التوزيع لإيجاد ناتج:

- (س) أوجد قيمة ك التي تجعل المقدار: $-0^{3} + -0 3 0^{3} 0$ يقبل القسمة بدون باق على المقدار : $- \omega^{\gamma} + \gamma - \omega^{\gamma} + 1$
 - $\frac{7}{7}$ ، $\frac{7}{7}$ ، وجد عددًا نسبيًا وآخر صحيحًا يقعان بين العددين : $\frac{7}{7}$ ، $\frac{7}{7}$
 - (-) اختصر لأبسط صورة : $(b+3)^{7} (b-3)(b+3)$ ثم أوجد قيمة الناتج عندما : b = -3
- (1) إذا كان متوسط مصاريف محمد ١٤ جنيهًا يوميًا ، فما المبلغ الذي يحتاجه محمد أسبوعيًا ليرفع متوسط مصاريفه إلى ١٧ جنيهًا يوميًا ؟
- (ب) إذا كان: ١ + ب ح = ٥





اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

ان کان: العدد $\frac{\sqrt{}}{\sqrt{}}$ عددًا نسبيًا فإن : س \neq

- (ب) ۲ Y-(i)
- (ج) صفر
- الحد الجبرى : ٢ س ص من الدرحة

(ج) الثالثة. (أ) الأولى. (ب) الثانية. (د) الرابعة.

- المعكوس الجمعى للعدد $\frac{\Psi}{2}$ هو
- $\frac{r}{2} \left(\Rightarrow \right) \qquad \frac{\circ}{r} \left(\downarrow \right) \qquad \frac{\circ}{r} \left(\uparrow \right)$ $\frac{2}{4}$
- فان : △ =
 - (ب) ۲۶ ٤(١) 17(2)
- إذا كان الوسط الحسابي للقيم: ٣، ٨، ٠٠ هـو ٥ فإن: -س =
 - Y(1) ٣ (ب) (ج) ۷ (2)3
 - ٦ العدد ١٧٥ يقبل القسمة على
 - (ب) ٤ T (1) (ج) ٥ (L) F

المل أكمل:

 $\dots = \{7, 3\} \cap \{5, 7\}$

T المنوال القيم: ٤، ٩، ٤، ٩، ٢، ٩، ٢ هو

العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين: $\frac{7}{3}$ ، مو $\frac{6}{3}$

٤ إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الخامس فإن عدد هذه القيم يساوي

 $\cdots - {}^{\mathsf{Y}}(\mathfrak{o} + \mathfrak{o}) = {}^{\mathsf{Y}}(\mathfrak{o} + \mathfrak{o})$

(د) ۹

(د) ٤ س

(د) س ص - ۲

V(2)

- $\Upsilon imes rac{r}{V} + \Lambda imes rac{r}{V} + 2 imes rac{r}{V} imes 1$ استخدم خاصية التوزيع في إيجاد ناتج :
 - $\frac{\gamma}{\psi}$ ، أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين $\frac{\gamma}{\psi}$
 - فأوجد قيمة المقدار: -س + ٢ ص + ع
- - (-) حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى : \wedge \wedge + \wedge \wedge + \wedge \wedge
 - (-1) + (2 - 3) + (3 4) اختصر لأبسط صورة المقدار : (-0.0 + 3) + (3.0 + 3)T = 0 ثم أوجد القيمة العددية للناتج: عندما
- وجد خارج قسمة : $-0^{7} + \Lambda 0 + 0$ على -0 + 0 حيث $-0 \neq -0$
 - (ب) فيما يلى درجات طالب في أحد الشهور:

علوم	دراسات	رياضيات	إنجليزى	عربي	المادة
۲.	۲٥	٤.	٣.	٠ ٣٥	الدرجة



17-(1)

محافظة بورسعيد

أجب عن الأسئلة الأتية :

- اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:
 - ····· = | 0 | | V- | T
 - Y(1)
- (ب) ۲– (ب)
- آ المنوال للقيم: ١، ٣، ٧، ٣، ٢، ٧، ٣ هو
- V () (ب) ۳ (ج) ۲ 1(1)

- - $\frac{7}{7} = 2 + 3 = \frac{7}{7}$ $\alpha + \beta = \frac{7}{7}$ $\alpha + \beta = \frac{7}{7}$

علوم	دراسات	رياضيات	إنجليزى	عربي	المادة
۲.	۲٥	٤.	٣.	٠ ٣٥	الدرجة

أوحد: [1] الوسيط للدرجات السابقة.

آ الوسط الحسابي للدرجات السابقة.

(حیث س ص ≠ ۰)

 $\frac{7}{\sqrt{1}} - 7 \times \frac{7}{\sqrt{1}} + 7 \times \frac{7}{\sqrt{1}} \times 7 \times \frac{7}{\sqrt{1}} = 7 \times \frac{7}{\sqrt{1}} \times 7 \times \frac{7}{\sqrt{1}} = 7 \times \frac{7}{\sqrt{1}} \times \frac{7}{\sqrt$

 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ، $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ، ن : (ب) أوجد ثلاثة أعداد نسبية محصورة بين $\frac{1}{\sqrt{2}}$

٣ الوسيط للقيم : ٤ ، ٨ ، ٣ ، ٥ ، ٧ هو

(۱) ۹- (۱)

الحد الجبرى: $-7 - \sqrt{9}$ ص من الدرجة

T إذا كان: $\frac{7}{1} = \frac{1}{2}$ فإن: $\frac{7}{1} = \frac{1}{2}$

أكمل ما يأتي:

 $\cdots = \frac{\xi}{q} \div \frac{1}{r}$

(پ) ٤ (چ) ٥

(۱) ٣-س ص (ب) ٣-س (ج) ٢-س

(۱) ۲ س ٤ (پ) ٢ س ٢ (چ) ٤ س ٢

آ إذا كان: ٣ س × ك = ١٢ س مان: ك =

۲ الوسط الحسابي للقيم: ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٦ هو

€ الشرط اللازم لجعل ___ و عددًا نسبيًا هو ص ل =

ه العامل المشترك الأعلى للمقدار الجبرى : $\pi - 0^{\gamma}$ - 0 - 1 - 0 هو

(ب) اطرح: ه س^۲ + ص^۲ – ۳ س ص + ۱ من ۲ س^۲ – ۲ س ص + ۳ ص^۲

(1) أوجد خارج قسمة: ٦ - ٧ ص + ٩ - ٧ ص ٢ - ١٢ - ٧ ص على ٣ - ٠ ص ص

- (†) اختصر لأبسط صورة: $(-\omega + \omega)^{2} (-\omega^{2} + \omega^{3})$
- (ب) الجدول التالي يبين درجات جهاد في امتحان مادة الرياضيات في ٦ شهور:

أبريل	مارس	فبراير	ديسمبر	نوقمير	أكتوبر	الشهر
٨	٧	٩	٦	٧	0	الدرجة

أوجد الوسط الحسابي للدرجات.



محافظة دمياط ادارة دمياط

أجِب عن الأسئلة الأتية : ﴿ (يسوح باستخدام الآلة الحاسبة) -

اختر الإجابة الصحيحة من بن الإجابات المعطاة:

$$\frac{1}{1}$$
 إذا كان: $\frac{20}{100} = 1$ فإن: $\frac{1}{100} = 1$

العدد
$$\frac{0}{V+-u}$$
 یکون عددًا نسبیًا عندما $-u \neq \dots$

$$(\iota)$$
 (ι) (ι) (ι) (ι)

$$(\iota)$$
 (د) (ι) (عفر (ι)

الحد الجبرى ه
$$-v^Y$$
 ص من الدرجة 2

$$V(\iota)$$
 (ι) (ι)

$$\mathcal{F} - \mathcal{T} \mathbf{1} \times \mathcal{T} \mathbf{1}^{\mathcal{T}} = \cdots$$

$$(1) - \Gamma q^{7} \qquad (2) - \Gamma q^{3} \qquad (3) - \Gamma q^{7}$$

الكمل العبارات الآتية ما يناسيها:

$$9 + \cdots + Y \longrightarrow = Y(Y + \cdots)$$

لعدد النسبى الذى يقع فى منتصف المسافة بين
$$\frac{1}{3}$$
 ، $\frac{1}{\pi}$ هو

$\frac{r}{V} - r \times \frac{r}{V} + o \times \frac{r}{V}$ باستخدام خاصیة التوزیع أوجد قیمة : $\frac{r}{V} - r \times \frac{r}{V} + o \times \frac{r}{V}$

$$\frac{\sqrt{1}}{2} \cdot \frac{1}{2}$$
 أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين العددين:

ور أ) اجمع: ه س + ۲ ص - ۲ ، ۲ س - ۲ ص - ه

(ب) أوجد خارج قسمة : ١٥ -
$$0^3$$
 + 1 - 0^7 - 1 - 0^7 على 1 - 0^7 (حيث - 0 $+$ حمفر)

$$= -0$$
 (أ) اختصر لأبسط صورة: $(-0 - 0)$ ($-0 + 0$) + ۲۰ ثم أوجد قيمة الناتج عندما: $-0 = 0$

(ب) الجدول الآتي يبين درجات أحد الطلاب في مادة الرياضيات في خمسة شهور:

.	أبريل	مارس	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	الشهر
	٥	. ٦	٨	٧	٩	الدرجة

أوجد الوسط الحسابي لدرجات الطالب.





Y-(1)

أجب عن الأسئلة الذتية :

العدد
$$\frac{-u-y}{-u+o}$$
 یکون نسبیًا إذا کان : $-u \neq \cdots$

$$\emptyset$$
 (a) $-(-1)$ $-(-1)$

$$\frac{7}{2}$$
اِذا کان : $\frac{7}{3} = \frac{7}{4}$ فإن : $\frac{7}{4} = \frac{7}{4}$

$$V = V + V = V' = V' + V = V'$$
 فإن : كان : (س + ۷) = $V = V'$

$$\frac{2}{r}(1)$$
 $^{r}e^{r}(2)$ $^{r}e^{r}(2)$ $^{r}e^{r}(2)$



آكمل العبارات التالية ما يناسبها:

- $\rightarrow + \frac{\omega^2}{r} + \omega^2 = \cdots$
- آ إذا كان المنوال للقيم: ٦ ، ٩ ، ٦٠ ، هو ٦ فإن: ص =
- 🍸 العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين العددين : 🦞 ، 🦞 هو
 - 1 =× \(\frac{\psi}{\rho}\) \(\xi\)

 - $\frac{\circ}{V} 7 imes \frac{\circ}{V} + 7 imes \frac{\circ}{V}$ استخدم خاصية التوزيع لإيجاد قيمة : $\frac{\circ}{V} \times 7 + \frac{\circ}{V} \times 7$
 - $\frac{7}{7}$ ، ب أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين $\frac{7}{7}$ ، $\frac{7}{7}$
 - $\{ 1 \}$ ما زیادة: $Y \omega^{Y} 0 \omega + Y$ عن Y W W W
- $Y = w (-y) + \gamma$ (۲ $w + \gamma$) (۲ $w \gamma$) (۲ $w + \gamma$)
- - (ت) الجدول التالي يبين درجات أعمال السنة لأحد الطلاب في مادة الرياضيات:

أبريل	مارس	فبراير	ديسمبر	نوقمبر	أكتوبر	الشهر
٣.	77	۲٥	79	. ۲۷	70	الدرجة

آ المتوسط الحسائي للدرجات.

🚺 محافظة بني سويف

أجِب عن الأسئلة الأتية :

أوجد: [1] الدرجة المنوالية.

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- $\frac{a}{b}$ (2) $\frac{\diamond}{\mathsf{q}} \; (\downarrow) \qquad \qquad \frac{\mathsf{q}}{\mathsf{q}} \; (\downarrow)$
 - المعكوس الجمعى للعدد $\left(\frac{-r}{2}\right)^{\text{Date}}$ يساوى
- $\frac{\pi}{s} \ (\Rightarrow) \qquad \qquad 1 (1)$ $\frac{2}{\pi}$ (2)

- = | 0 | | V- | T
- (۱) ۲– (۱) ۲ (۱) ۲ (۲) ۲۰ (۱) 17-(2)
 - ٤ الوسيط للقيم : ٤ ، ٨ ، ٣ ، ٥ ، ٧ هو
- · V(2) (ب) ۲ (ج) ه ۲ (۱)
 - آ إذا كان: $\frac{0}{+0-7}$ عددًا نسبيًا فإن: $-0 \neq \cdots$
 - (أ) صفر (ب) ٢ 0(1) (ج) ۲–
- إذا كان المنوال للقيم: ٧ ، ه ، · + ١ ، ه ، ٧ هو ه فإن: · = · · · · · · (د) ۷ (۱) ۱ (ب) کا

الما أكمل ما بأتي:

- ۱ العدد ۲, ۰ في صورة ۲ يكون
- آ إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الخامس فإن عدد هذه القيم
 - ٣] مربع طول ضلعه ٦ سم فإن محيطه
 - کے باقی طرح -۲ س من ۳ س هو
 - ٥ / ، ١ ، ٢ ، ٢ ، ٥ ، ٨ ، (بنفس التسلسل)
 - $\frac{r}{V} 7 \times \frac{r}{V} + 9 \times \frac{r}{V}$ باستخدام خاصية التوزيع أوجد ناتج:
 - (ب) أوجد ناتج جمع: ١ + ٢ ٠ ١ ، ٣٩ ٦ ٠ + ٤
 - (-+) اقسم: $-\sqrt{7} + \lambda \sqrt{1} + \lambda + \sqrt{1}$ علی $-\sqrt{7} + \sqrt{1}$ (حیث $-\sqrt{7} + \sqrt{1}$)
 - (أ) أوجد ثلاثة أعداد نسبية محصورة بين: 🕆 ، 🛨
 - (ب) اطرح: ٣ -س ص + ٢ ع من ه -س ٣ ص + ٤ ع
- - (أ) اختصر لأبسط صورة : (س + ٣) (س ٣) + ٩
- (\cdot,\cdot) أوجد عددًا نسبيًا يقع عند ربع المسافة بين : $\frac{1}{\sqrt{-1}}$ ، $\frac{1}{\sqrt{-1}}$ من جهة العدد الأصغر.



(ج) الجدول الآتي بين درجات طالب في أحد الشهور:

	علوم	دراسات	رياضيات	إنجليزى	عربي	المادة
Ì	٩	٧	١.	٦	٨	الدرجة

أوجد: ١ المتوسط الحسابي لدرجات هذا الطالب.

٢ الوسيط لدرجات الطالب.





(د) ٠٤

(د) - ۱۱ -س

أجب عن الأسئلة الأثية :

اختر الإجابة الصحيحة من بن الإجابات المعطاة:

$$\boxed{1} | \{i \in \mathbb{Z} : \frac{\neg \sigma}{\neg \sigma} = \neg \sigma \text{ if } i \in \mathbb{Z} \}$$

$$(\iota)$$
 (ι) (ι) (ι)

الشرط اللازم لجعل
$$\frac{V}{V_{-1}-V_{-1}}$$
 عددًا نسبيًا هو $-v \neq \dots$

$$\Upsilon\pm (1)$$
 $\Upsilon-(2)$ $\Upsilon(1)$

$$U+V(z)$$
 $U-V(z)$ $\frac{V}{U}(z)$ $UV(z)$

$$(-1)$$
 (۱) -7 (۱) -7 (۱) -7

ا أكمل ما بأتي:

- ک العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين: $\frac{7}{7}$ ، $\frac{3}{8}$ هو
- - $\frac{\tau}{6}$ ، $\frac{\tau}{6}$ ، $\frac{\tau}{6}$ ، $\frac{\tau}{6}$ ، $\frac{\tau}{6}$
 - (\cdot) استخدم خاصية التوزيع لإيجاد قيمة : $rac{7}{4} imes rac{7}{4} imes rac{7}{4} imes rac{7}{4}$
 - - (-) اختصر لأبسط صورة : $(-0+7)^{2}+(-0-7)$ (س ۲)
 - - (ب) الجدول التالي يبين درجات أحد الطلاب في اختبار مادة الرياضيات:

أبريل	مارس	فبراير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	الشهر
٣.	۲۷	79	۲۷	47	7.7	الدرجة

آ الوسط الحسابي لهذه الدرجات. أوجد: ١ الدرجة المنوالية.



احارة سوهاج

(د) السادسة.

1-(2)

أجِب عن الأسئلة الأتية : `

- درجة الحد الجبرى ٦ -س ص ص هي
- (۱) الثانية. (ب) الثالثة. (ج) الخامسة.
 - $\dots = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}$
- $\frac{V}{2}$ $\frac{V}{2}$ $\frac{V}{2}$ $\frac{V}{2}$ $\frac{V}{2}$ $\frac{V}{2}$ $\frac{V}{2}$
- T إذا كان : (-w T) $(-w + T) = -w^{T} A$ فإن : $A = -w^{T}$
- 9(1) (ب) ٦- (ج) (L) F

(د) الخامسة.

إدارة إسنا توجيه الرياضيات



محافظة الأقصر	(19)	z.	
			*

أجب عن الأسئلة الأتية :

بين الإجابات المعطاة:	من	الصحيحة	اختر الإجابة	
,	w			1

- ا الحد الجبرى ٢ -س^٢ ص^٢ من الدرجة
- (1) الثانية. (ب) الثالثة. (ج) الرابعة.
- $\circ (1) \qquad \circ (2) \qquad \qquad 7 (1)$
 - χ..... = γ γ
- (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱)
- إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الرابع فإن عدد هذه القيم
 - (۱) ٤ (ج) ه (ج) ۷ (د) ۷
 - إذا كان الوسط الحسابي لدرجات خمسة طلاب هو ٢٠
 - فإن مجموع درجاتهم يساوى
 - (۱) ۲۰ (ب) ٤ (ج) ه
 - ٦ العدد مليون = ألف.
 - ١٠٠٠ (١) ١٠٠٠ (١) ١٠٠٠ (١) ١٠٠٠ (١)

آ أكمل ما يأتى :

- ا العدد النسبى الذي ليس له معكوس ضربي هو
- آ هو القيمة الأكثر تكرارًا أو شيوعًا بين القيم.
- العامل المشترك الأعلى المقدار: ٢ س + ٢ ص هو
 - کا ، ه ، ۹ ، ۹ ، ۱۳۰۰۰ (بنفس التسلسل)
 - ٥ أصغر عدد طبيعى هو

ا أكمل ما يأتي:

- 1 إذا كان ترتيب الوسيط لعدد من القيم هو الخامس فإن عدد هذه القيم هو
 - آ المحايد الجمعي في ن هو
 - ····· = | o- | | V- | \mathbb{T}
 - ع مكعب طول حرفه ٢ ب فإن حجمه
 - 0 العدد $\frac{-0-0}{-0-V}$ \in 0 إذا كانت : $\infty \neq \cdots$
 - $\frac{\gamma}{\pi}$ ، $\frac{\xi}{0}$: أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين
 - (-1) al igles: $-0^{7} 0 0 1 3$ as $(-1)^{7} + 7 0 7$?

عل بإخراج العامل المشترك الأعلى: ٣ -س + ١٥ -س ص

- (-) اختصر لأبسط صورة : $0 \sqrt{1 1} 1 \sqrt{1 1} + \sqrt{1 1}$
- $Arr imes rac{V}{V} heta imes rac{V}{V} + heta imes rac{V}{V} heta he$
- (۱) أوجد خارج قسمة: ١٤ ٣٠ ص ٣٥ ٠٠ ٠٠ ص ص على ٧ ٠٠ ص ص (۱) أوجد خارج قسمة: ١٤ ٠٠ ص ص ح ٠٠)
 - (ب) أوجد:
 - آ قيمة ب إذا كان الوسط الحسابي للقيم: ٨ ، ب ، ٧ ، ه هو ٦
 - 🔣 الوسيط للقيم: ٣ ، ٥ ، ١٢ ، ١١ ، ٨ ، ١٠

- $\frac{r}{V}$ + Y $imes \frac{r}{V}$ + $\xi imes \frac{r}{V}$: أي استخدم خاصية التوزيع في إيجاد قيمة المتحدم خاصية التوزيع في المجاد قيمة المتحدم خاصية التوزيع في المجاد المتحدم خاصية التوزيع في المتحدم خاصية المتحدم خاصي
 - (ب) اطرح: ٣ س + ٢ ع من ٥ ٠ ٣ ص + ٤ ع
 - $\frac{\tau}{\circ}$ ، $\frac{1}{\tau}$ ، أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين : $\frac{1}{\tau}$ ، $\frac{\tau}{\circ}$
- (\cdot) أوجد خارج قسمة : ۱۲ $-0^{7} 9 0^{7} + 7 0$ على 7 0 حيث $-0 \neq 0$
 - (1) اختصر لأبسط صورة : (-u + 7) (-u 7) + 9 ثم أوجد قيمة الناتج عندما : -u = 0
 - (ب) أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال للقيم: ٢ ، ٣ ، ٩ ، ٧ ، ٩



إدارة العريش توجيه الرياضيات محافظة شمال سيناء

ه (۲۰)

أجب عن الأسئلة الأتية :

- ا أكمل ما يأتى :
- آ إذا كان ترتيب الوسيط لعدد من القيم هو العاشر فإن عدد هذه القيم يساوى

 - کے ۲ س ۲ ص × = ۳ س عن۲ ص
 - ٥ المنوال لمجموعة القيم: ٣، ٢، ٣، ٢، ٥، ٣، ٧ هو
 - T = (Y U + V) = Y U V = V
 - آ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

 - (۱) ۶ (ب) ۸ (ب) ٤
 - (۱) ۲ (۱) ۲ (۱) ۲ (۱) ۲ (۱) ۲ (۱) ۲ (۱)

- (بنفس التسلسل) ۱۲،۷،۲۳
- (ب) ۱۷ (ج) ۲۱ (ج) ۲۲ (۱)
 - عَ إِذَا كَانَ : ٢ سِ = ه فإن : ٢ سِ =
 - ۲۰ (۵) ۲۰ (ج) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱)
 - 0 إذا كان: $\frac{6}{-0.00}$ عددًا نسبيًا فإن: -0.00
- (ب) ۲ (ج) ۲ (۲)
- باستخدم خاصیة التوزیع أوجد قیمة : $\frac{7}{7} imes 3 + \frac{7}{7} imes 7 imes 7$
 - $\frac{1}{r}$ ، $\frac{1}{r}$: نب تقع بین الثق أعداد نسبیة تقع بین الثق أعداد نسبی أعداد نسبی أعداد نسبی أعداد نسبی الثق أعداد نسبی أ
- - (ب) أوجد خارج قسمة:

۱۸ - س° - ۱۲ - س۲ + ۲ - س۲ علی ۲ - س۲ (حیث - س خ)

- - (ب) إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة القيم: ٣، ٢، ٧ ، ك ، ٥ هو ٤

أوجد: قدمة ك